

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください
また、必要時に読めるよう大切に保管しておいてください

第2類医薬品

新胃の宝

特徴

「新胃の宝」は各成分の安定性を考え、消化酵素・健胃剤を緑色顆粒に、制酸剤を白色顆粒にと別々の顆粒にして混合した胃腸薬です。

口に含むとよい香りがして、サッと溶け、服用しやすくなっています。

1. 消化作用 優れた消化力を発揮する酵素ビオチンアスターゼが、食べ過ぎ、飲みすぎ、食欲不振を速やかに改善します。
2. 制酸作用 即効性制酸剤の炭酸水素ナトリウムと持続性制酸剤のメタケイ酸アルミン酸マグネシウムの組み合わせにより、胃内の酸度を調整します。
3. 健胃生薬 芳香性、辛味性の健胃生薬の配合により、だ液、胃液などの分泌を促し、胃の働きを活発にします。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないこと

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 次の診断を受けた人。腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症	状
皮膚	発疹・発赤、	かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
便秘、下痢

【効能・効果】

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、胃もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲みすぎ、胃痛、消化促進、消化不良、食欲不振、食べ過ぎ、消化不良による胃部・腹部膨満感

【用法・用量】

次の量を食後に服用すること。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15才以上）	1 包	3 回
11才以上15才未満	2/3 包	
8才以上11才未満	1/2 包	
5才以上8才未満	1/3 包	
5才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】


1日量3包（1包1.3g）中

成 分	含 量	各 成 分 の 作 用
ビオチンアスターゼ	450mg	優れた消化力を発揮する酵素で、食べ過ぎ、飲みすぎ、食欲不振を速やかに改善します。
沈降炭酸カルシウム	750mg	即効性の炭酸水素ナトリウムと持続性のメタケイ酸アルミン酸マグネシウムが胃内の酸度を調整し、胃酸の過剰分泌による胃酸過多、胸やけ、げっぷを改善します。
炭酸水素ナトリウム	600mg	
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	450mg	
ケイヒ末	300mg	芳香性健胃生薬。 だ液、胃液などの分泌を促し、胃の働きを活発にし、食欲不振、消化不良に効果を発揮します。
シユクシャ末	30mg	
ショウキョウ末	60mg	
ウイキョウ末	60mg	

添加物：乳糖、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、銅クロロフィリンNa、ℓ-メントールを含有

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
4. 1包を分割して服用した残りは、袋の口を二回折り返して保管し、2日以内に服用すること。



製品についてのお問い合わせは、配置員の方または下記までお願いします。
株式会社三九製薬 〒930-0314 富山県中新川郡上市町若杉55
電話番号 076-472-1011 受付時間 9:00~16:30（土、日、祝日を除く）