

2012年5月改訂（記載要領変更に伴う改訂）

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要などときには読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

和漢生薬配合
満月胃腸薬
制酸・健胃・消化薬

満月胃腸薬は、食べすぎた時のもたれ、飲みすぎ、二日酔等の胃腸の不快症状や、胃酸过多、消化不良にすぐれた効果のある胃腸薬です。

満月胃腸薬の特徴

1. そう快な香氣と清涼感のもつメントールを配合しております。
2. 芳香性を有する健胃生薬のみを配合しており、苦味がないので、服用しやすく、又芳香性健胃生薬は胃腸内の防腐効果がすぐれています。
3. 強力な消化酵素ビオヂアスターを配合し、糖質、脂質、たんぱく質を速やかに消化します。（3包中、でんぶん糊精化力650～1300単位、蛋白消化力400単位です。）
4. 速効性制酸剤「炭酸水素ナトリウム」と、持続性制酸剤「メタケイ酸アルミニウムマグネシウム（ノイシリン）」を組み合わせ、胃内の酸度を速やかに長く一定に調整し、胃酸を中和するとともに胃粘膜を保護します。（3包中、制酸力は0.1N塩酸の消費量として260～310mlです。）



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 次の人は服用しないこと 透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

（1）医師の治療を受けている人。（2）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。（3）次の診断を受けた人。腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】 胃酸过多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ（胃もたれ）、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、恶心）、嘔吐、飲み過ぎ、胃痛、食欲不振、胃弱、消化不良

【用法・用量】 次の量を、食後に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数	年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包		5歳以上8歳未満	1/3包	3回
11歳以上15歳未満	2/3包	3回	3歳以上5歳未満	1/4包	
8歳以上11歳未満	1/2包		3歳未満		服用しないこと

（用法・用量に関する注意）

- （1）定められた用法・用量を厳守すること。
- （2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】 1日量(3包)中

炭酸水素ナトリウム	900mg	チヨウジエキス	80mg
メタケイ酸アルミニウムマグネシウム（ノイシリン）	600mg	ウイキョウエキス	100mg
沈降炭酸カルシウム	200mg	ビオヂアスター	240mg
ケイヒエキス	200mg		

添加物として、メントール、カンゾウエキス、乳糖、パレイショデンプン、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、銅クロロフィリンナトリウムを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる。）。
4. 1包を分割した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。



お問い合わせ先 薬王製薬株式会社「お客様相談室」電話0744-33-8855
受付時間 9:00~17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元 薬王製薬株式会社 奈良県磯城郡田原本町245