

飲みすぎ
食べすぎ
ムカムカ

ウコン2,000mg

配合

5種の生薬

ウルソデオキシコール酸
カルニチン塩化物



飲みすぎ
食べすぎ
ムカムカ

イストサン胃腸GOLD液

こんな時に
ご利用ください。


【飲みすぎ】



【食べすぎ】



【ムカムカ】



第3類医薬品

服用に際して、この説明文を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

販売名:イストサン胃腸ゴールド液

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

[成分・分量] 1びん(30mL)中

ウコンエキス……………133.3mg
(原生薬換算量 2,000mg)
ガジュツエキス……………22.5mg
(原生薬換算量 450mg)
ショウキョウチンキ……………0.25mL
(原生薬換算量 50mg)
ケイヒチンキ……………0.25mL
(原生薬換算量 50mg)
オウレン流エキス……………0.15mL
(原生薬換算量 150mg)
カルニチン塩化物……………120mg
ウルソデオキシコール酸……………15mg
添加物:クエン酸Na、*l*-メントール、D-ソルビトール、炭酸水素Na、エタノール、安息香酸Na、パラベン、デキストリン、白糖、タウマチン

<成分・分量に関連する注意>

生薬成分配合のため、沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。

[用法・用量]

次の1回量を服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

年齢	1回量	服用回数
成人 (15歳以上)	1びん (30mL)	1日2回
15歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>
定められた用法・用量を厳守してください。

[効能・効果]

食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、消化促進

[保管及び取扱い上の注意]

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

米田薬品株式会社
大阪市浪速区塩草3丁目2-2
お客様相談窓口

電話 06-6562-7411
受付時間 10:00~17:00
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)