

## 第2類医薬品



胃もたれ



胃痛



食べすぎ

## ワキ胃腸薬 セダン™



ワキ胃腸薬セダンは、生薬をバランスよく配合し、二日酔い、食欲不振、胸やけ、食べすぎ、胃の不快感などに効きめがある爽やかな香りのスッキリと飲みやすい顆粒タイプの胃腸薬です。



## 使用上の注意



## してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと  
透折療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと  
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること（母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある。）
4. 長期連用しないこと



## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (5) 次の症状のある人。  
排尿困難
  - (6) 次の診断を受けた人。  
腎臓病、心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
□のかわき、便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## その他の注意

母乳が出にくくなることもある。

## 【効能・効果】

胃弱、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃痛、胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、嘔吐、はきけ(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良

## 【用法・用量】

年 齢	1 回 量
15才以上	1包
11才以上15才未満	2/3包
8才以上11才未満	1/2包
5才以上8才未満	1/3包
3才以上5才未満	1/4包

いずれも1日3回食後服用する。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法及び用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

## 【成分・分量】 3包中(大人1日量)

成 分	分 量
ピオチアスターゼ	300mg
炭酸水素ナトリウム	900mg
酸化マグネシウム	200mg
合成ケイ酸アルミニウム	440mg
ケイヒ末	200mg
カンゾウ末	300mg
ゲンチアナ末	250mg
ロートエキス	20mg

添加物として $\ell$ -メントール、ウイキョウ油、ヒドロキシプロピルセルロース、アラビアゴム末を含む。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。


### ■お問い合わせ先

ワキ製薬株式会社 お客様相談室

住所 奈良県北葛城郡広陵町南郷898

電話 0120-200-114

受付時間 午前9時から午後5時まで(土、日、祝日を除く)



製造販売元

# ワキ製薬株式会社

〒635-0814 奈良県北葛城郡広陵町南郷898

URL : <http://www.a-kusuri.co.jp/>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 [http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話 : 0120-149-931(フリーダイヤル)