

飲みすぎ・食べすぎ・胸やけ・胃痛に

第2類医薬品

イキシシ

顆粒

生薬配合製剤

〔効能又は効果〕

胃酸過多、胸やけ、胃部・腹部膨満感、もたれ（胃もたれ）、胃重、胸つかえ、げっぷ（おくび）、飲みすぎ（過飲）、消化不良、胃弱、食べ過ぎ（過食）、食欲不振（食欲減退）、はき気（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気悪心）、嘔吐、胃痛、消化促進、胃部不快感。

〔用法及び用量〕

大人（15才以上）	1回 1包
11才以上15才未満	1回2/3包
8才以上11才未満	1回1/2包
5才以上8才未満	1回1/3包
3才以上5才未満	1回1/4包
3才未満	服用しないで下さい。

※1日3回食後服用する。

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

〔成分及び分量〕 1日量(3包)中 1包1.300mg

メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	1,000mg
日局 沈降炭酸カルシウム	600mg
日局 チョウジ末	200mg
日局 ケイヒ末	450mg
日局 ウイキョウ末	300mg
ビオチン	300mg
リコチンN-P	380mg
結合剤 日局 ヒドロキシプロピルセルロース	60mg
矯味剤 日局 l-メントール	30mg
賦形剤 日局 結晶セルロース	適量

⚠〔使用上の注意〕

⊗ してはいけないこと

- 次の人は服用しないで下さい。
透析療法を受けている人。
- 長期連用しないで下さい。

⊕ 相談すること

- 次の人は、服用前に医師又は、薬剤師に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 高齢者
(3) 本人又は、家族がアレルギー体質の人。
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) むくみの症状のある人。
(6) 次の診断を受けた人

腎臓病、高血圧、心臓病

- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- 5～6日位服用しても症状がよくなる場合

⚠ 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 1包を分割した残りを使用する場合には袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用して下さい。
- 配置期限のきれた製品は服用しないで下さい。

製造販売元 **和田製薬株式会社**
奈良県御所市池の内340
TEL 0745-62-5624