

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

食べすぎ・飲みすぎ・胸やけ

さとう胃腸薬〈分包〉

さとう胃腸薬〈分包〉は、制酸成分、消化酵素、健胃生薬を配合した胃腸薬です。さとう胃腸薬〈分包〉は、速効性で持続性の制酸成分である合成ヒドロタルサイト、複合消化酵素ジオザスターゼ1000、鎮痛作用のあるロートエキスに5種類の健胃生薬を配合した服用しやすい胃腸薬です。食べすぎ、飲みすぎ、胸やけ、はきけ、胃痛、消化不良による胃部・腹部膨満感などに効果があります。



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。

透析療法を受けている人

2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。

胃腸鎮痛鎮痙薬

3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけてください。

(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)

4. 長期連用しないでください。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 高齢者。

(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。

(5) 薬によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

(6) 次の症状のある人。

排尿困難

(7) 次の診断を受けた人。

腎臓病、心臓病、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

(2) 2週間位服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

口のかわき、下痢、便秘

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効能又は効果

胃酸過多、胃部不快感、胃重、胃もたれ、胃痛、はきけ（胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき）、嘔吐、飲みすぎ、胸つかえ、げっぷ、食欲不振、消化不良、消化促進、胃弱、食べすぎ、消化不良による胃部・腹部膨満感、胃部・腹部膨満感、胸やけ

用法及び用量

次の量を食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人(15歳以上)	1 包	3 回
11歳～14歳	$\frac{2}{3}$ 包	
8 歳～10歳	$\frac{1}{2}$ 包	
5 歳～ 7 歳	$\frac{1}{3}$ 包	
乳幼児(5歳未満)	服用しないこと	

<用法及び用量に関連する注意>

- (1)定められた用法及び用量を守ってください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分及び分量

3包(大人の1日量)中

成 分	含 量	はたらき
合成ヒドロタルサイト	1500mg	過剰の胃酸を中和して、不快な過酸症状を改善するとともに荒れた胃粘膜を保護します。
ビオザアスターゼ1000	150mg	食物の消化を助け、食べすぎ、消化不良に効果があります。胃腸の負担を軽くします。
ロートエキス	30mg	胃酸の分泌を抑え、胃の痛みを和らげます。
ゲンチアナ末	75mg	低下した胃腸の働きを活発にし、消化液の分泌を促して消化機能を整えます。
シヨウキョウ末	120mg	
ケイヒ末	300mg	
ウイキョウ末	105mg	
チョウジ末	60mg	

添加物としてL-メントール、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、ポビドン、無水ケイ酸を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

問い合わせ先

- 1) 本製品の購入店
- 2) 佐藤薬品工業株式会社 医薬情報室
TEL 0744-28-0021
受付時間 9:00～16:30(土・日・祝日を除く)