

服用前にこの説明書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう保管して下さい。


# いつまでも胃に食物が残った感じの時に パンシロントリム<sup>®</sup>（顆粒）

消化管運動改善剤 トリメブチンマレイン酸塩配合



弱った胃をイキイキ動かし  
**胃もたれ**  
**膨満感**を  
スキッと軽くします

**パンシロントリム<sup>®</sup>（顆粒）**は、消化管運動改善剤である  
トリメブチンマレイン酸塩を配合した胃もたれ・膨満感に効果的に働く胃薬です。



## ⚠ 使用上の注意

### ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないで下さい。

透析療法を受けている人

2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。

胃腸鎮痛鎮痙薬

3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。

(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある)

4. 長期連用しないで下さい。

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談下さい。

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 高齢者。(4) 本人又は家族がアレルギー体质の人。(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6) 次の症状のある人。 ●排尿困難

(7) 次の診断を受けた人。 ●腎臓病、肝臓病、心臓病、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	眠気、めまい、倦怠感、頭痛
その他	動悸、口内しびれ感、腹鳴

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

(2) 2週間位服用しても症状がよくならない場合

3.次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談下さい。  
口のかわき、便秘、下痢

■他の注意 母乳が出にくくなることがあります。

## ■効能・効果

もたれ(胃もたれ)、胃重、胃部膨満感、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔い・悪酔のむかつき、嘔気、恶心)、胃部不快感、食べ過ぎ、飲み過ぎ、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感、食欲不振(食欲減退)、胃弱、消化不良、胸つかえ、胃痛、胸やけ、胃酸過多、げっぷ(おくび)、嘔吐

## ■用法・用量

次の量を食後に、水又はお湯で服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
15才以上	1包	3回
15才未満	服用しないこと	

(用法・用量に関する注意)

用法・用量を厳守して下さい。

## ■有効成分 (1日量 3包中)

●消化管運動改善剤	トリメブチンマレイン酸塩……………300mg	疲れて弱った胃の運動を高めて、胃の消化作用を助ける。
●制酸剤	炭酸水素ナトリウム……………300mg 沈降炭酸カルシウム……………600mg メタケイ酸アルミニン酸……………240mg マグネシウム(乾燥物換算)	過剰な胃酸を中和して胃の内部のpHを整える。
	ロートエキス……………30mg	胃酸の分泌を抑制し胃の内部のpHを整える。
●消化剤	ビオチアスター2000……………120mg リバーゼAP6……………45mg	胃内の食物の消化を促進する。
●粘膜修復剤	カンゾウ末……………150mg	弱った胃粘膜を保護・修復する。

添加物:D-マンニトール、カルメロース、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、ステアリン酸Ca、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、l-メントール、香料、セルロース

## ■保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
  - 小児の手の届かない所に保管して下さい。
  - 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わる)
  - 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用下さい。

## ■包装

14包、28包

お問い合わせ先:ロート製薬お客様安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを  
お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

**東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230**

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

発売元 **ロート製薬株式会社**  
大阪市生野区巽西1-8-1

製造販売元 **田辺三菱製薬株式会社**  
大阪市中央区道修町3-2-10