

この説明文書は服用前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

胃腸鎮痛鎮痙薬

イノキュアS

第2類医薬品

胃や腸などを動かしている内臓平滑筋のけいれんや過度の緊張により、胃痛、腹痛、さしこみ等の症状があらわれます。

イノキュアSはブチルスコポラミン臭化物が内臓平滑筋のけいれんや過度の緊張を抑えるとともに、胃酸の分泌を抑えます。さらに、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムが胃酸を中和して胃粘膜を保護することで、胃痛、さしこみ、胸やけ等の胃腸症状に優れた効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 透析療法を受けている人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他の胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと

(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある。)

4. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。

排尿困難

- (6) 次の診断を受けた人。

心臓病、腎臓病、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

口のかわき、便秘、目のかすみ

4. 5～6回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効 能

胃痛、腹痛、さしこみ(疝痛、癩)、胃酸過多、胸やけ

用法・用量

次の量を、水又はぬるま湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	服 用 回 数
成人 (15才以上)	1カプセル	1日3回を限度として服用してください。 服用間隔は4時間以上おいてください。
15才未満	服用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 食前・食後にかかわらず服用できます。
- (3) 右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押しつけて裏面のアルミ箔を破り、取り出ししてお飲みください。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



成分・分量 1カプセル中

成 分 名	分 量	作 用
ブチルスコポラミン臭化物	10mg	内臓平滑筋のけいれんや過度の緊張を抑えます。また、胃酸分泌を抑制します。
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	135mg	過剰な胃酸を中和して胃粘膜を保護します。

添加物：ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖水和物、ゼラチン、ラウリル硫酸Na、青色1号、黄色5号

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。



製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室

電話：058-278-3933

受付時間：10時～16時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の お問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構
☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)

小林薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市中鶯1丁目139番地