

平成17年7月改訂

この説明書は本剤とともに保管し
服用に際しては必ずお読み下さい。

胃腸鎮痛鎮痙剤

胃痛、腹痛、さしこみ **ノイパパ錠**
によく効く **NOIPAPA TABLET**

胃痛、腹痛、さしこみ等はとても苦しいものです。

★ノイパパ錠は胃の運動亢進と胃液分泌を抑制し、胃酸を低下させる臭化メチルベナクチジウム、胃腸の平滑筋に直接作用して平滑筋を弛緩させる塩酸パパベリンならびに胆汁分泌促進作用を有するデヒドロコール酸と、三成分の総合作用により、胃痛、腹痛、さしこみ、胃酸過多、胸やけによく効く薬です。

本剤は直径9mmの割線を有する白色の錠剤です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。
他の胃腸鎮痛鎮痙剤、乗物酔い薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (6) 次の症状のある人 排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人 心臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ、排尿困難

 - (2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。
口のかわき、便秘

成分と作用

本剤6錠中に次の成分を含んでいます。

成分	6錠中	作用
臭化メチル ベナクチジウム	30mg	副交感神経遮断薬で、消化管運動と平滑筋緊張や胃液の分泌抑制作用を有します。
塩酸パパベリン	90mg	血管平滑筋の異常緊張を抑制し、内臓平滑筋を弛緩させ、鎮けい作用を有します。
デヒドロコール酸	150mg	即効性の胆汁分泌促進剤です。

添加物として乳糖、セルロース、CMC-Ca及びヒドロキシプロピルセルロースを含む。

効能・効果

胃痛、腹痛、さしこみ、胃酸過多、胸やけ

用法・用量

次の1回量を1日3回服用して下さい。服用間隔は4時間以上おいて下さい。

年齢	成人(15歳以上)	7歳以上15歳未満
1回量	2錠	1錠


〈用法・用量に関する注意〉

(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

(2)7歳未満の小児には服用させないで下さい。

(3)錠剤の取り出し方

図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して下さい。



(誤ってそのまま飲み込んだりしますと食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)

保管及び取り扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。

(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。

(3)他の容器に入れ替えないで下さい。

(誤用の原因になったり品質が変化します。)

☆ お問い合わせ先

〒841-0032 鳥栖市大正町716

日本薬品株式会社 お客様相談室

電話 0942-82-2029 FAX 0942-82-2036

受付時間：午前9時より午後5時まで

(土、日、祝日を除く)



(07J)

製造販売元
日本薬品株式会社
鳥栖市大正町716