

登 録 商 標

# 和漢胃腸薬



鯉<sup>り</sup>  
膽<sup>たん</sup>  
丸<sup>がん</sup>

第2類医薬品

製造販売元

株式会社 きぬや薬舗

奈良県御所市今住475番地

お問い合わせ先

同 左

電話 0745-67-0016

# 鯉 膽 丸

## 第2類医薬品

### 効 能・効 果

下痢,消化不良による下痢,腹痛を伴う下痢,軟便,くだり腹,食あたり,水あたり,はき下し

### 用 法・用 量

15才以上…1回1包 11才~14才…1回 $\frac{2}{3}$ 包 7才~10才…1回 $\frac{1}{2}$ 包 3才~6才…1回 $\frac{1}{3}$ 包 1才~2才…1回 $\frac{1}{4}$ 包  
1日3回毎食後なるべく30分以内に服用して下さい。

(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。(2)1才未満の乳児には服用させないで下さい。(3)用法及び用量を厳守して下さい。

### 成 分・分 量 1日量(3包)中

センブリ末…120mg オウレン末…150mg オウバク末…600mg ケイヒ末…600mg ゲンチアナ末…300mg ゲンノショウコ末…900mg  
ロートエキス…30mg 動物胆…30mg 添加物として、バレイション、カルメロースCa、合成ケイ酸Al、ヒドロキシプロピルセルロース、デヒドロ酢酸Na、軽質無水ケイ酸、ヒプロメロース、タール色素(赤色3号)を含有する。

### 使用上の注意

**してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと  
胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、薬物酔い薬
- 2.服用後、薬物又は機械類の運転操作をしないこと(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある。)
- 3.授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある。)

### 相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1)医師の治療を受けている人 (2)発熱を伴う下痢のある人、  
下痢のある人又は粘液便の続く人 (3)妊婦又は妊娠している  
と思われる人 (4)高齢者 (5)薬などによりアレルギー症状を  
起こしたことがある人 (6)次の症状のある人 排尿困難  
(7)次の診断を受けた人 心臓病、緑内障
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、  
薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難	その他	顔のはてり、異常なまぶしさ

- 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症  
状の持続又は増強が見られた場合には服用を中止し、医師、薬  
剤師又は登録販売者に相談すること 口のかき、目のかすみ
- 4.5~6日間服用しても症状がよくなるらない場合は服用を中止し、  
この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**その他の注意** 母乳が出にくくなることもある

### 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返し  
て保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5)配置期限の過ぎた製品は服用しないで下さい。

2包(1.2g×2)入 ￥300+税



副作用救済制度  
☎0120-149-931