

改訂年月2011年11月

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また必要な時に読めるように大切に保存してください。

下痢止め薬

赤玉はら薬D 第2類医薬品

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
 - (3)急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。
(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがあります)
 - (4)高齢者。
2. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

効能又は効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便。

裏面もよくご覧ください

用法及び用量

成人(15歳以上) 1回……………15粒
11歳以上15歳未満 1回……………10粒
8歳以上11歳未満 1回……………7粒
5歳以上8歳未満 1回……………5粒
5歳未満……………服用しないでください
以上いずれも1日2回を限度とし、食後
または食間に服用してください。服用間
隔は4時間以上おいてください。

<用法及び用量に関連する注意>

- (1)用法及び用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の
指導監督のもとに服用させてください。

成分及び分量 1日量(30粒)中

アクリノール水和物……………45mg
タンニン酸ベルベリン ……150mg
ゲンノショウコ末 ……600mg
センブリ末 ……100mg
添加物として、ケイヒ末、沈降炭酸カル
シウム、コメデンプン、寒梅粉、カルメ
ロースカルシウム、サリチル酸、タルク、
酸化チタン、ゼラチン、アラビアゴム、
黄色5号、赤色3号を含有します。

保管及び取扱い上の注意


- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼
しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してくだ
さい。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わり
ます。)
- (4)期限を過ぎた製品は服用しないでくだ
さい。

製造販売元 **大同製薬株式会社**

富山県高岡市三女子113

お客様
相談窓口

電話：(0766)22-0998

副作用被害救済制度  0120-149-931