

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

止瀉薬

第2類医薬品

パスコート下痢止め顆粒

■特徴

パスコート下痢止め顆粒は、サツと溶けるさわやか顆粒。携帯に便利なスティック包装ですので、突然の下痢に、どこでも飲める、下痢止め薬です。固形剤の苦手なお子様からご年配の方まで、安心してご使用になれます。

▲ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと。
胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。
(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある)
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある)



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人
 - (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人
(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがある)
 - (4) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (5) 高齢者
 - (6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (7) 次の症状のある人
排尿困難
 - (8) 次の診断を受けた人
心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
口のかわき、目のかすみ
4. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■ その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

(裏面もお読みください)

■効能・効果

腹痛を伴う下痢、下痢、消化不良による下痢、食あたり、水あたり、はき下し、くだり腹、軟便

■用法・用量

1日3回を限度として、服用間隔は4時間以上おいてください。

年 令	1 回 量	1 日 服 用 回 数
15才以上(大人)	1包	3 回
11才以上15才未満	2/3包	
8才以上11才未満	1/2包	
5才以上8才未満	1/3包	
3才以上5才未満	1/4包	
3才未満	服用しないでください	

「用法・用量に関連する注意」

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合は、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■成分・分量

(1.2g×3包中：大人1日量)

成 分	分 量
タンニン酸ベルベリン	300mg
ロートエキス5倍散	300mg (ロートエキスとして 60mg)


添加物として、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、キシリトール、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロースナトリウム、軽質無水ケイ酸、タルク、エタノール、プロピレングリコール、グリセリン及び香料を含有します。

■保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
株式会社パナケイア製薬「お客様相談係」電話(0766)36-1118
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用救済制度
電話：0120-149-931

発 売 元  日新薬品株式会社

製造販売元

株式会社パナケイア製薬

富山市辰巳町2丁目3番20号

富山県高岡市中田4576番地