

便秘治療薬

新ドクレックス

よく食べ、よく眠り、そしてよき快便することが健康のバロメーターとされています。健康人では一般に1日1回、便があるのが普通ですが、2～3日に1回でも定期的に便があれば便秘とはいえません。しかし量が少なく苦痛を訴えるときは便秘と言えます。便秘にもいろいろの型がありますが、「新ドクレックス」は食物や生活様式の変化、精神的影響によって一時的におこる便秘（急性便秘という）や婦人や老人に多くみられるように大腸の運動が減退しておこる常習便秘（弛緩性便秘^{しかん}という）の人に効果的です。

新ドクレックスの服用方法

- (1) 便秘薬の量は、その人その時の加減で多少の変化はありますが、少しやわらか気味の便が自然に気持ちよく出て、後に残った感じがなく、お腹がスーと軽くなった様子、それがあなたの適量です。それを忘れないで下さい。
- (2) 初めてご服用の方は、便秘の軽い・重い程度によって薬の作用に個人差がありますので、初回は1錠から服用して下さい。

成分・分量（3錠中）

ジオクチルソジウムスルホサクシネート	36mg
センナ末	165mg
センナ実末	165mg
ピサコジル	15mg

添加物として、結晶セルロース、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスボピドン、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、タルク、メタアクリル酸コポリマーLD、クエン酸トリエチル、アラビアゴム末、ゼラチン、白糖、マクロゴール6000、沈降炭酸Ca、酸化チタン、カルメロースNa、カルナウバロウを含有する。

効能・効果

便秘。

便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔。

用法・用量

大人（15才以上）1回 1～3錠を1日1回就寝前（または空腹時）に服用してください。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
- 2.授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
- 3.大量に服用しないこと

相談すること

- 1.次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、悪心・嘔吐

- 2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

- (2) 1週間位服用しても症状がよくなる場合

- 3.次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
下痢

<保管及び取扱い上の注意>

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。

包装 30錠、68錠

お問い合わせ先

商品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記に
お願い申し上げます。

株式会社ユービ「お客様相談室」電話番号 06-6531-5511
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **株 式 会 社 ユ ー ビ**

〒550-0015 大阪市西区南堀江4-26-6