

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

便秘がちで肌あれが気になる方に

第2類医薬品

ウイズワン[®]


with One

植物性便秘薬

〔特徴〕

ウイズワンは、食物繊維（ダイエタリーファイバー）と生薬成分を配合することにより、穏やかな作用で快いお通じを誘います。

- 食物繊維＋生薬成分の植物性便秘薬。
プラントゴ・オバタ種皮（膨潤性）＋センノシド（刺激性）の物理的、化学的作用によって自然に近いお通じを促し、排便のリズムを戻します。
- 生活の欧風化に伴って、日常の食生活でとかく不足しがちな繊維質を補いますので、繊維不足が原因となっている便秘にも適しています。
- 服用しやすいチョコレート風味の顆粒剤で、携帯に便利なスティック包装ですから、必要な数だけ外出先や旅行先にお持ちになることができます。
ウイズワンは、便秘の不快な症状をしずめ、規則正しい排便リズムを作ります。



*便秘について

便秘の原因としては、

- 大腸のぜん動運動のおとろえ、緊張の低下
- 腸内で水分が吸収されすぎて、便が硬くなる
- 食生活の欧米化に伴い食物繊維の摂取が減少し、便のカサ（容量）が不足する等があげられます。
また、便秘になると肌あれ、吹出物、頭重、のぼせ、食欲不振、おなかが張る等の症状を伴うことがあり、特に、肌あれ、吹出物は便秘の方の多くが訴える症状です。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
3. 大量に服用しないでください

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、悪心・嘔吐
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

(2) 1週間位服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
下痢

（必ず裏面もお読みください）

〔効能・効果〕

- ・便秘
- ・便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

〔用法・用量〕

年 齢	1 回 量	用 法
成人（15才以上）	1/2～1包	1日3回毎食後に服用してください。 ただし、便秘の程度、状態には個人差がありますので、初回は最小量を用い、便秘の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。
11才以上 15才未満	1/3～2/3包	
7才以上 11才未満	1/4～1/2包	
7才未満	服用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (3) コップ1杯(約180mL)の水又はぬるま湯でかまずにおのみください。

〔成 分〕 1日量6g（3包）中

成 分	分 量	は た ら き
ブランタゴ・オバタ種皮	2250mg	腸内で水分を吸収して膨張し、便のカサを増やして、腸のぜん動運動を促します。腸内細菌や腸内異常発酵による毒素を吸収して、腸への刺激を取り除く作用もあります。硬くなった便に適切なやわらかさを与えて、自然に近いお通じを促します。
センノシド	83.53mg (センノシドA・Bとして48mg)	植物センナに含まれている成分で、腸のぜん動運動を高め、弱った腸の働きを活発にします。

添加物として、粉末還元麦芽糖水アメ、乳糖水和物、L-メントール、香料、プロピレングリコール、エタノール、赤色一〇二号、黄色五号及び青色一号を含有する。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の服用により、尿が黄褐色又は赤色になることがありますが、これは主成分のセンノシドによるものですから心配ありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。


お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室
TEL 03-3661-2080(ダイヤルイン)
受付時間 9:00～17:50(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
フリーダイヤル ☎ 0120-149-931

発売元
 **ゼリア新薬工業株式会社**
東京都中央区日本橋小舟町10-11



製造販売元
日新製薬株式会社
山形県天童市清池東二丁目3番1号

