

この添付文書は服用前に必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう本剤とともに保管してください。



便秘や便秘に伴う諸症状の緩和に  
生薬配合の便秘薬

**ラクサチン<sup>®</sup>S**

第②類医薬品

便秘になると腹部膨満、頭重、のぼせなどの不快な症状があらわれたり、また、肌あれ、吹出物、痔などの原因になることがあります。  
ラクサチンSは、大腸のぜん動運動を促し、おだやかな便通をもたらす和漢生薬を主体とした緩下薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. **本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。**  
他の瀉下薬(下剤)
2. **授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。**
3. **大量に服用しないでください。**



相談すること

1. **次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。**
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人
  - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (5) 次の症状のある人 はげしい腹痛、悪心・嘔吐
2. **次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。**

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位  | 症 状          |
|-------|--------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ    |
| 消 化 器 | はげしい腹痛、悪心・嘔吐 |

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくならない場合
3. **次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。**

下痢

効能・効果

- 便秘
- 便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振、腹部膨満、腸内異常發酵、痔

裏面の注意事項もよくお読みください。

## 用法・用量

次の量を、1日1回就寝前に服用してください。

ただし、便秘の症状には個人差がありますので、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

| 年齢         | 2～3日便通がないとき | 4日以上便通がないとき |
|------------|-------------|-------------|
| 15歳以上（成人）  | 2～3錠        | 4～5錠        |
| 11歳以上15歳未満 | 1～2錠        | 3～4錠        |
| 11歳未満      | 服用しないこと     |             |

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成分・分量〔5錠(成人1日最大量)中〕

|                                                            |       |                |      |
|------------------------------------------------------------|-------|----------------|------|
| ダイオウ末……………                                                 | 300mg | ケイヒ末……………      | 90mg |
| センナ末……………                                                  | 500mg | カンゾウエキス末……………  | 50mg |
| アロエ末……………                                                  | 300mg | （カンゾウ350mgに相当） |      |
| 添加物としてヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、エチルセルロース、マクロゴールを含有します。 |       |                |      |

※本剤の服用により、尿が黄褐色～赤褐色になることがあります。これは本剤中のダイオウ等によるものであり、異常ではありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)一度開栓した後は、品質保持の点からなるべく早めに服用してください。
- (5)使用期限の経過した製品は服用しないでください。

## その他

本剤は、生薬を配合していますので、製品により錠剤の色が多少異なる場合がありますが、薬効に変わりはありません。

## お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願いします。  
日野薬品工業株式会社 お客様相談窓口（土、日、祝日を除く）  
電話 0748-52-1232 受付時間 8時30分～17時

®登録商標

製造販売元

**日野薬品工業株式会社**  
滋賀県蒲生郡日野町上野田119