

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるように大切に保管して下さい。

日本薬局方 センナ末 通 救 散

瀉下薬（下剤） **第2類医薬品**

センナを粉末にした緩下剤で便秘にゆるやかな作用があり、便秘に伴う症状に効果があります。センナは古くアラビアの医師によって使用された生薬で欧米諸国においても汎用され、珍重されています。日本でも日本薬局方では初版から現代版まで継続して収載されたお薬です。センナは大部分がインドから輸入されています。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現状の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 1、本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。
他の瀉下薬(下剤)
- 2、授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
- 3、大量に服用しないで下さい。



相談すること

- 1、次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
- 2、服用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので直ちに服用を中止し、この文書を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

- 3、服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
下痢
- 4、5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

- 便秘
- 便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

用法・用量

成人(15歳以上) 1日1回0.375g～0.75gをなるべく就寝前に服用して下さい。

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態を見ながら少しずつ増量又は減量してください。

添付のステンレス匙は1杯0.2gです。

成分・分量

1日量(0.75g)中 日本薬局方センナ末0.75g

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

本剤をご使用になられて、何かお気づきの点がございましたら、下記までご連絡頂きますようお願いいたします。

有限会社 松原粉末薬品

TEL:0766-36-1164

受付時間：9時～17時まで(土、日、祝日を除く)