

# マリンマグ細粒剤 1.8g×20包

2013年5月改訂(記載要領変更に伴う改訂)

服用に際して、説明文を必ずお読み下さい

第3類医薬品



## マリンマグ

生まれは海、育ちは自然の医薬品

しゃげやく  
瀉下薬

便秘或いは便秘に伴ういろいろな症状を改善する薬です

### △ 使用上の注意

#### ⊗【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、他の瀉下薬(下剤)を服用しないこと

#### 👤【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- ・ 医師の治療を受けている人
- ・ 妊婦又は妊娠していると思われる人
- ・ 激しい腹痛、はきけ・嘔吐の症状のある人
- ・ 腎臓病の診断を受けた人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- ・ 消化器：激しい腹痛、はきけ・嘔吐
- ・ 精神神経系：強い眠気、意識がうすれる
- ・ 循環器：立ちくらみ、脈が遅くなる
- ・ 呼吸器：息苦しい
- ・ その他：筋力の低下、口のかわき

3. 服用後、下痢の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合やならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効果又は効果】  
・ 便秘  
・ 便秘に伴う次の症状の緩和  
・ 頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔、食欲不振(食欲減退)

### <保管及び取扱上の注意>

- ・ 直射日光の当たらない(湿気の少ない)涼しい所に保管すること
- ・ 小児の手の届かない所に保管すること
- ・ 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

## 【成分及び分量】

1包中  
酸化マグネシウム  
レメントール

微量 1.8g

## 【用法及び用量】

1日1回、就寝前（又は空腹時）に服用すること。  
ただし、初回は最小量を用い便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量すること。

成人（15歳以上）	1回 2/3～ 1包
11歳以上15歳未満	1回 1/2～2/3包
7歳以上11歳未満	1回 1/3～1/2包
3歳以上7歳未満	1回 1/4～1/3包
3歳未満	服用しないこと

## 【用法及び用量に関連する注意】

- ・定められた用法用量を厳守すること。
- ・小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

製造販売



株式会社

三保製薬研究所

〒424-0401 静岡県静岡市清水区中河内1513  
TEL (054)396-3321 FAX (054)396-3371  
お客様相談窓口 TEL (054)396-3375  
(8:30～16:30)

副作用救済制度

☎0120-149-931



本体 ¥1000+税

BK-010

