

丹 陽 印

登録



商標

第3類医薬品

日本薬局方

吉見 ジュウヤク 500g

使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)



本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと

相談すること

(他の瀉下薬(下剤))

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 次の症状のある人 (はげしい腹痛、吐き気・嘔吐)
 - 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|---------------|
| 消化器 | はげしい腹痛、吐き気・嘔吐 |
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (下痢)
 - 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、このような場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 1ヵ月位(便秘、便秘に伴う吹出物に服用する場合は5~6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能又は効果

便秘、尿量減少、便秘に伴う吹出物

用法及び用量

成人(15歳以上)は1日量15gを水約600mLをもって煮て約400mLに煮詰め、かすをこして取り去り、食前又は食間3回に分服してください。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に保管してください
- 小児の手の届かない所に保管してください
- 他の容器に入れ替えないでください

吉見製薬株式会社

大阪市中央区船越町 2-1-17
電話 06(6941)7164

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
電話 0120-149-931 フリーダイヤル



上
4 951225 311647