

生薬緩下剤

ラーゼンA

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

改訂年月 2013.8

第②類医薬品

「ラーゼンA」は「ドイツ植物療法」を基礎とし、センナ実とセンナ葉より成る「調和のとれた生薬便秘治療剤」です。



使用上の注意

してはいけないこと



[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる.]

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと。
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること。
3. 大量に服用しないこと。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 次の症状のある人。 はげしい腹痛、吐き気・嘔吐。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。 下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくならない場合には服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能・効果、用法・用量、成分・分量、保管及び取扱上の注意、お問い合わせ先については、裏面をご覧ください。

効能又は効果

便秘

便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

用法及び用量

次の量を1日2回を限度とし、なるべく空腹時に服用すること。

服用間隔は4時間以上おくこと。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ、増量又は減量すること。

	年 齢	1回量	1日服用回数
分包品	成人(15歳以上)	1包(0.5g)～2包(1g)	2回を限度
大入品	成人(15歳以上)	添付の匙[0.5g(すり切り)]にて0.5g～1g	
	15歳未満	服用しないこと	

用法及び用量を厳守すること。

成分及び分量 2g(4包)中

はたらき	成分	含量
生薬、瀉下薬	センナ末	481.6mg
生薬、瀉下薬	センナジツ末	1,444.8mg

添加物として、カンゾウエキス、デヒドロ酢酸Na、アラビアゴム、バレイショデンプンを含有する。(分包品1包量…500mg)

内容量 大入 75g入

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

発 売 元 **株式会社タキザワ漢方廠**

埼玉県さいたま市大宮区堀の内町2丁目623-1

お問い合わせ先

製造販売元 **渡辺薬品工業株式会社**

富山市水橋町555番地

TEL 076-478-0205