

スルーリベール「分包」 20包(1包0.75g)

△【使用上の注意】

【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
3. 大量に服用しないでください。

【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3) 本人または家族がアレルギー体質の人。
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。はげしい腹痛、悪心・嘔吐
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師または薬剤師に相談してください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

(2) 1週間位服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。 下痢

【成分】 1日量2包(1.5g)中

センナ実 …………… 1.125g

センナ …………… 0.375g

【効能・効果】

便秘 便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

【用法・用量】

次の1回量を1日2回朝夕の空腹時(または食前あるいは食間)に水またはお湯で服用してください。ただし、便秘の程度や状態には個人差があるので、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら、少しずつ増量または減量してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包～½包	2 回
15歳未満の小児	服用しないこと	

【保管および取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

※本製品は天然物(生薬)を用いており、
また滅菌処理をした原料を使用しておりますので、若干色が変わるおそれがありますが、効果は変わりありません。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

皇漢堂製薬株式会社

兵庫県尼崎市長洲本通2丁目8番27号

お客様相談窓口

フリーダイヤル0120-023520

受付時間

平日9:00～17:00(土、日、祝日を除く)