

ご使用前にこの説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

## 便秘用坐薬

# オイレスA

日本薬局方 ビサコジル坐剤

第2類医薬品

- オイレスAは有効成分（ビサコジル）が直腸内で直接作用します。
- 挿入後、早い場合で3～5分後に穏やかな便意があらわれます。
- 便意があらわれても、1～3分ぐらいがまんしてから排便してください。
- 小さな坐薬なので違和感なく挿入できます。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

##### 連用しないこと

（常用すると、効果が減弱し（いわゆる“なれ”が生じ）薬剤にたよりがちになる。）



#### 相談すること

##### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
（流産の危険性があるので使用しないことが望ましい。）
- (3) 次の症状のある人  
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

##### 2. 2～3回使用しても排便がない場合は使用を中止し、この文書を持って 医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

#### その他の注意

##### 次の症状があらわれることがある

肛門部の刺激感、腹部不快感、腹痛

### 【効能・効果】


便秘

## 【用法・用量】

12歳以上1回1個を直腸内に挿入し、それで効果のみられない場合は、さらにもう1個を挿入してください。

ただし、1日2個を限度としてください。

12歳未満は使用しないでください。



### ＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんすること。  
(使用後、すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがある。)
- (3) 12歳以上15歳未満の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (4) 本剤が軟らかい場合には、しばらく冷やした後に使用すること。また、硬すぎる場合には、軟らかくなった後に使用すること。
- (5) 肛門にのみ使用すること。

### 【成分・分量】1個(1g)中

成分	分量	はたらき
ピサコジル	10mg	排便促進作用

添加物：ハードファット

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所(1~30℃)に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 坐剤の先端を下向きにして保管すること(軟化しても坐剤の変形を防ぐことができる。)
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。また開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用すること。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

大木製薬株式会社 お客様相談室

電話 03-3256-5051

受付時間 平日9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

発売元

大木製薬株式会社

東京都千代田区神田鍛冶町3-3

製造販売元

中外医薬生産株式会社

三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931