

## ⚠ 使用上の注意



## してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。  
他の駆虫薬、ヒマシ油
2. 再度駆虫薬を必要とする場合、1ヶ月以上の間隔をあけてください。



## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤・かゆみ
消化器	胃痛、腹痛、吐き気・嘔吐
精神神経系	頭痛、めまい

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
口のかわき
4. 服用しても効果がみられない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## ▲ 用法及び用量

大人(15歳以上)は1日量 10gを水約 100mL をもって煮て約 60mL に煮つめ、滓をしぼって取り去り、早朝または就寝前の空腹時に服用してください。

## ▲ 効能及び効果

回虫の駆除。

## ▲ 保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 開封後はなるべく早く使用し、長く放置しないでください。
- (5) 煎薬の場合は、腐敗防止のため煎液を冷所に保管してください。
- (6) 本品には防虫防カビのため脱酸素剤を封入しておりますが、これを本品と一緒に煎じたり、食べたりしないようご注意ください。
- (7) 服用に際しては、説明文をよくお読みください。

品質には常に細心の注意をはらっておりますが、本品は天然物(生薬)の性質上、吸湿してカビが生えたり、虫がつくことがあります。万一不良品がございましたら開封後でもお取替えいたします。

