

第2類医薬品

回寿仙

シンワの生薬強心剤



生薬強心剤
第2類医薬品
回寿仙



第2類医薬品
シンワの生薬強心剤
金粒 20粒 (10粒×2)
どうき、息切れ、気付け

生薬強心剤
第2類医薬品
回寿仙

第2類医薬品

回寿仙

シンワの生薬強心剤

どうき、息切れ、気付け

第2類医薬品

シンワの生薬強心剤

どうき、息切れ、気付け

第2類医薬品

△【使用上の注意】

- ☒ してはいけないこと
 - 1. 本剤を服用している間は他の強心薬を服用しないこと。
- 相談すること
 - 1. 次の人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - (1) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (2) 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

| 関係部位 | 症状 |
|------|--------|
| 消化器 | 吐き気・嘔吐 |

3. 5～6日間服用しても症状がよくなりません場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【効能・効果】
どうき、息切れ、気付け

製造番号
使用期限

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931



製造販売元
（お問い合わせ先）
昭和化学工業株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町大原市場157番地
電話：0748-88-2174
受付時間：9時～17時（土、日、祝除く）

販売元
伸和製薬株式会社
東京都荒川区南千住5丁目17番8号

【用法・用量】 通常大人1日1回1粒。但し症状により2粒服用して可。なお、毎日1粒～2粒連続服用してもよい。(1)定められた用法・用量を厳守すること。(2)腫ま

ずみ服用すること。(3)15歳未満の小児には、服用させないこと。

【成分・分量】 2粒中

| | | | | | |
|------|--------|------|-------|---------------|---------|
| コオウ | 1.5mg | ハニド | 5.0mg | ニンジン | 49.75mg |
| サラシ | 0.5mg | リョウケ | 1.0mg | クワン | 5.0mg |
| エラタン | 1.25mg | セリク | 2.0mg | ロクショウ | 1.5mg |
| カンヤク | 4.0mg | チヨウク | 6.5mg | イカリソウエキ | 1.0mg |
| カンユク | 5.0mg | | | （原生薬100mgに相当） | |

【保管及び取扱上の注意】 (1) 小児の手の届かない所に保管すること。(2) 直射日光の当たらない湿気の少ない所に保管すること。(3) 服用をさせ、品質を保持するために、他の容器に入れなおさないこと。