

この説明書は、お薬とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

第3類医薬品

Acoop クミアイ

コレステム

血清高コレステロール改善薬

特徴

- クミアイコレステムは、高くなった血液中のコレステロールを改善する医薬品です。
- リボフラビン酸エステルが、体内で過剰なコレステロールが作られるのを抑制し、さらに余分なコレステロールを体の外に排泄することで、血清高コレステロールを改善していきます。
- 飲みやすい小さな錠剤です。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
医師の治療を受けている人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振、恶心・嘔吐、胸やけ

(2)しばらく服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
下痢

効能・効果

血清高コレステロールの改善

用法・用量

次の量を、食後に服用してください。

年齢	1回量	1日の服用回数
成人（15歳以上）	2錠	2回
15歳未満	服用しないこと	

成分・分量

1日量(4錠)中

成 分	含 量	は た ら き
リボフラビン 酪酸エステル (ビタミンB2)	60mg	持続性の高い活性型のビタミンB2です。コレステロールが体の中で過剰に作られるのを抑制し、さらに余分なコレステロールを体の外に排泄することで、血清高コレステロールを改善していきます。

添加物として、乳糖、セルロース、トウモロコシデンプン、カルメロースCa、タルク、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mgを含有する。

成分・分量に関する注意

- リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB2)により尿が黄色くなることがあります、心配はありません。
- 本剤に見られる小さな赤い斑点は有効成分に由来するものであり、品質には問題ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4)服用のつどキャップをよくしめてください。
- (5)瓶の中の詰め物は、キャップをあけた後は捨ててください。(詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防ぐためのものです。)
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

コレステロールについて

血液中の脂質はコレステロールと中性脂肪に分けることができ、コレステロールは細胞膜やホルモン、胆汁酸などの材料に、中性脂肪は体を動かすエネルギー源になります。血液中の脂質は肝臓で合成されるものと、食事から摂ったものから成り、バランスが保たれていれば体に欠かせないのですが、多くなると動脈硬化の大きな原因になります。

コレステロールを下げるためには、正しい食生活（野菜や魚は積極的に摂取）、肥満解消、適度な運動、禁煙といった生活習慣の改善が大切です。



お問い合わせ先

クミアイ家庭薬相談窓口

電話：0238-46-2013

[月～金曜日 9:00～17:00(祝日を除く)]

販 売 者 **全国農業協同組合連合会**

製造販売者 **協同薬品工業株式会社**

山形県東置賜郡川西町大字西大塚930