

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください
また、必要時に読めるよう大切に保管しておいてください

2013年11月

血清高コレステロール改善薬

第3類医薬品

コレスパン

【特徴】

- コレスパンは、血清高コレステロールを改善し、血清高コレステロールに伴う手足の冷えやしびれを緩和します。
- コレスパンは、肝臓におけるコレステロールの代謝を促進するパンテチン、小腸におけるコレステロールの吸収を抑制する大豆油不けん化物(ソイステロール)、抗酸化作用により過酸化脂質の生成を抑制し、血流を良くして、手足の冷えやしびれを緩和する天然型ビタミンE(酢酸d- α -トコフェロール)が含まれています。これら3つの有効成分により効果が発揮されます。
- コレスパンは、飲みやすいソフトカプセルです。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、胃部不快感、胸やけ、食欲不振、腹痛

(1か月ほど服用後、医療機関でコレステロール値を測定すること)

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢、軟便
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

- 血清高コレステロールの改善
- 血清高コレステロールに伴う末梢血行障害（手足の冷え・しびれ）の緩和

【用法・用量】

次の量を食後に服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	2カプセル	3回
15才未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 血清高コレステロールの改善には食事療法が大切なので、本剤を服用しても食事療法を行うこと。

【成分・分量】

1日量（6カプセル）中

成 分	分 量	はたらき
日本薬局方パンテチン (80%パンテチン水溶液)	375mg	肝臓においてコレステロールの代謝促進をはかり、血液中の余分なコレステロールを減少させる。
大豆油不けん化物 (ソイステロール)	600mg	大豆由来の成分で、小腸におけるコレステロールの吸収を抑制し、排泄を促す働きがある。
酢酸d- α -トコフェロール (天然型ビタミンE)	100mg	抗酸化作用により、血管に障害を与える過酸化脂質の生成を抑制し、末梢血行障害（手足の冷え、しびれ）を改善する。

添加物：ポリソルベート80、グリセリン脂肪酸エステル、サフラワー油、ゼラチン、コハク化ゼラチン、濃グリセリン、酸化チタン、黄色三二酸化鉄を含有

【保管および取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までお願いします。
北日本製薬株式会社 〒930-0314 富山県中新川郡上市町若杉55
電話番号076-472-1011 受付時間9:00~16:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **北日本製薬株式会社**
富山県中新川郡上市町若杉55