

2012年10月改訂
(記載要領変更に伴う改訂)

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要などに読めるよう大切に保管してください。

第1類医薬品

血管補強・血圧降下剤

セルペロイシン錠

特徴

セルペロイシン錠は、ローウォルフィアセルペンチナ総アルカロイド等による降圧作用とコンドロイチン硫酸ナトリウム、アスコルビン酸等による動脈硬化の予防作用等がある薬です。高血圧症の緩和と動脈硬化の予防、血管補強による出血予防に効果をあらわします。



使用上の注意



してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります]

1. 次の人は服用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の診断を受けた人。

消化性潰瘍、てんかん、腎不全、気管支ぜんそく

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃腸出血
精神神経系	頭痛、不眠、早朝覚醒、意識の低下、けいれん
循 環 器	動悸
呼 吸 器	呼吸が荒い
そ の 他	悲感気分、貧血、からだがだるい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
横紋筋融解症	手足・肩・腰等の筋肉が痛む、手足がしびれる、力が入らない、こぼる、全身がだるい、赤褐色尿等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

下痢

4. しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

▼裏面もお読みください

効能・効果

- 本態性および腎性高血圧症
- 心臓機能障害あるいは大脳血行障害を伴う高血圧症
- 高血圧随伴症
- 動脈硬化の治療および予防
- 脳溢血・血管脆弱による出血予防

用法・用量

次の1回量を朝夕、白湯又は水にて服用してください。

服用目的	1回量	服用回数
諸種高血圧症の治療	2錠	1日2回
血圧降下後又は予防	1錠	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 15才未満の小児は服用しないでください。

成分・分量 2錠中

はたらき	成分	分量
中枢鎮静作用により血圧を下げます	ローウォルフィアセルベンチナ総アルカロイド	2mg
血管細胞の老化を防いだり、血管を補強して動脈硬化や出血を予防します。また、血管と血液の抵抗をやわらげ血流をよくして血圧を下げます	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	100mg
	タウリン	50mg
	イノシトール	20mg
	重酒石酸コリン	25mg
	アミノフィリン水和物	10mg
	ルチン水和物	60mg
	DL-メチオニン	20mg
	アスコルビン酸(ビタミンC)	50mg

添加物：赤色102号、バレイショデンプン、タルク、炭酸Ca、ゼラチン、サラシミツロウ、ステアリン酸Mg、白糖、リン酸水素Ca水和物、酸化チタン、カルメロースNa、アラビアゴム、カルナウバロウ

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 湿気により錠剤表面が変色することがありますので、ぬれた手で触れないでください。
- (5) ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤破損防止用です。開封時に捨ててください。
- (6) 箱の「開封年月日」記入欄にビンを開封した日付を記入しておいてください。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- (8) ビンの中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

米田薬品株式会社 お客様相談窓口

電話 06-6562-7411 受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)



米田薬品株式会社
大阪市浪速区塩草3丁目2-2