

登録



商標

第2類医薬品

日本薬局方

吉見 **モクツウ**

500g



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - 医師の治療を受けている人
  - 妊娠又は妊娠していると思われる人
- 1ヶ月位服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能又は効果

尿量減少

用法及び用量

大人(15歳以上)は1日量10gを、水約600mlをもって煮て約400mlに煮つめ、滓をこして取り去り、食前または食間3回に分服する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に保管してください
- 小児の手の届かない所に保管してください
- 他の容器に入れ替えないでください
- 開封後はなるべく早く使用し、長く放置しないでください
- 煎薬の場合は、腐敗防止のため煎液を冷所に保管してください
- 本品には防虫防カビのため脱酸素剤を封入しておりますが、これを本品と一緒に煎じたり食べたりしないようご注意ください
- 服用に際しては、説明文をよくお読みください

吉見製薬株式会社

大阪市中央区船越町 2-1-17

電話 06(6941)7164

副作用被害救済制度の問合せ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 フリーダイヤル



951225323145