

*: 2009年12月改訂
 **: 2010年6月改訂

服用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
 また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮咳去痰薬

第2類医薬品

桜皮抽出成分、ニンジンエキス、リゾチーム塩酸塩配合
 せき・たんに…

ブロコデ®せき止め錠

《ブロコデせき止め錠》は、

- たんを切れやすくする桜皮抽出物にニンジンエキスとリゾチーム塩酸塩を加え、せき・たんの症状改善をより効果的にした製剤です。



使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい

本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい

(眠気があらわれることがあります。)

*4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい

**5. 過量服用・長期連用しないで下さい



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人

服用前にこの説明文書を必ずお読み下さい

せき、たんに…
 ブロコデ®せき止め錠

(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

(6) 次の症状のある人

高熱、排尿困難

(7) 次の診断を受けた人

心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい

便秘、口のかわき

■ 効能・効果

せき、たん

■ 用法・用量

年 齢	1回服用量	1日服用回数
15 歳 以 上	4錠 	3回：食後に服用して下さい
11歳以上15歳未満	3錠 	
8歳以上11歳未満	2錠 	
5歳以上 8歳未満	1錠 	
5 歳 未 満	服用しないで下さい	

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 用法・用量を厳守して下さい。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

■ 成 分

成 分	含 量 (12錠中)	作 用
桜皮抽出物	300 mg (オウヒとして 810mg)	桜皮（生薬）から抽出した植物の成分を含有しており、おだやかな作用によりたんを切れやすくします
ニンジン軟エキス	100 mg (ニンジンとして 1,100mg)	せき・たんの症状改善に効果を発揮し、せきによる体力消耗を緩和します
ジヒドロコデインリン酸塩	24 mg	せきを鎮めます
リゾチーム塩酸塩 (リゾチームとして)	48 mg (力価)	たんを切れやすくします
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60 mg	気管支をひろげ、せきを鎮めます
グアヤコール スルホン酸カリウム	240 mg	たんを切れやすくします
クロルフェニラミンマレイン酸塩	10.5mg	上気道炎に伴うせきを鎮めます
無水カフェイン	90 mg	ねむけ防止作用を有します

添加物：CMC、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、乳糖、タルク、ステアリン酸Mg、アラビアゴム、酸化チタン、ステアリン酸、白糖、ヒプロメロース、ポビドン、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、フマル酸、カラメル、カルナウバロウ

■ 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
4. めれた手で取り扱わないで下さい(本剤は糖衣錠のため、水分が錠剤につくと、表面の糖衣が一部溶けて、変色又はむらを生ずることがあります。)
5. ビンの中のつめものはフタを開けた後は取り除いて下さい。
6. 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8

電 話 03(6667)3232

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

Y05 登録商標



Daiichi-Sankyo

製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋小網町1-8