

服用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

T05

鎮咳去痰薬

第1類医薬品

せき・たん・ぜんそくに……

強力アスメトン[®]

《強力アスメトン》は、

のどや気管支などの炎症に伴って起こるせきだけでなく、ぜんそく発作時のせきを鎮め、たんの切れをよくする薬剤を配合した製剤です。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい
(眠気があらわれることがあります。)
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 発熱している小児
(4) けいれんを起こしたことがある小児
(5) 高齢者
(6) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(7) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

- (8) 次の症状のある人
高熱、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	動悸、排尿困難

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい
口のかわき

■ 効能・効果

せき、たん、ぜんそく

■ 用法・用量

年齢	1回服用量	1日服用回数
15歳以上	2カプセル 	3回
8歳以上15歳未満	1カプセル 	
8歳未満	服用しないで下さい	

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 用法・用量を厳守して下さい。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

服用前にこの説明文書を必ずお読み下さい

せき・たん・ぜんそくに……
強力アスメトン[®]

■ 成 分

《強力アスメトン》は、「AS」の文字を印刷した白色の硬カプセル剤で、中に白色～微黄色の粒を含む粉末をつめてあります。6カプセル中に次の成分を含んでいます。

成 分	含 量 (6カプセル中)	作 用
メキシフェナミン塩酸塩	75mg	気管支の痙攣を抑え、ぜんそく発作時のせきを鎮めます。たんの切れをよくします。
ノスカピン	42mg	せきを抑えます。
アミノフィリン水和物	150mg	気管支の痙攣を抑え、気管支粘膜の腫脹を抑え、ぜんそく発作時のせきを鎮めます。たんの切れをよくします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	上気道炎に伴うせきを鎮めます。

添加物：酸化Mg、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mg、ゼラチン、亜硫酸水素Na、ラウリル硫酸Na、酸化チタン

■ 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8

電 話 03(6667)3232

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

T05®登録商標

 製造販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋小網町1-8