

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

鎮咳・去痰薬

# ゼリアせき止めシロップ「小児用」

ZERIA COUGH SYRUP  
for children

## 〔特 徴〕

せきは、のどや気管支の病気にもなつてあらわれる症状のひとつで、せきが出始めると、せき込みの刺激が原因となつて段々ひどくなり、呼吸が苦しくなり、また睡眠がさまたげられたりして、体力を消耗させ、しばしば病気の回復をおくらせます。

したがつて、せきをはやく止め苦痛をやわらげることが必要です。

ゼリアせき止めシロップ「小児用」は、鎮咳作用（せきを鎮める作用）の強いリン酸ジヒドロコデインとdl-塩酸メチルエフェドリンを配合し、更に抗ヒスタミン剤のマレイン酸クロルフェニラミンを加えることによりアレルギー性のせきにも効果を発揮します。また、去痰作用（たんを切る作用）を有するグリセリンモノグアヤコールエーテル、オウヒ軟稠エキスを配合した、甘くて飲みやすい特にお子様のためにつくられたせき止めシロップです。

## ⚠ 使用上の注意

本剤は小児用ですが、鎮咳去痰薬として定められた一般的な注意事項を記載しております。

### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
（眠気があらわれることがあります。）

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)授乳中の人。  
(4)高齢者。  
(5)本人又は家族がアレルギー体質の人。  
(6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(7)次の症状のある人。  
高熱、排尿困難  
(8)次の診断を受けた人。  
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください  
(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

- (2)5～6回服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください  
便秘、口のかわき

（必ず裏面もお読みください）

## 〔効能・効果〕


せき，たん

## 〔用法・用量〕

年 齢	1 回量	用 法
5 才以上 8 才未満	7.5mL	1 日 3 ～ 4 回服用してください。 なお，1 日 6 回まで服用することができますが，その場合は約 4 時間の間隔をおいて服用してください。(添付計量カップ使用)
3 才以上 5 才未満	5mL	
1 才以上 3 才未満	4mL	
3 ヶ月以上 1 才未満	2mL	
3 ヶ月未満	服用しないでください。	

### 〈用法や用量に関する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には，保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)生後 3 ヶ月以上であっても 1 才未満の乳児には，医師の診療を受けさせることを優先し，止むを得ない場合にのみ服用させてください。
- (3)定められた用法，用量を厳守してください。
- (4)計量カップの使い方  
付属の計量カップは，ブルーのシュリンクカバーをはずしてご使用ください。



## 〔成 分〕 1 日量 (45mL) 中

成 分	分 量	はたらき
リン酸ジヒドロコデイン	9mg	せきの症状を緩和します。
dl-塩酸メチルエフェドリン	15mg	気管支をひろげ，せきを鎮めます。
マレイン酸クロルフェニラミン	3mg	のどの炎症を鎮め，せきの症状を緩和します。
グリセリンモノグアヤコールエーテル	90mg	気管支の緊張をやわらげ，たんを液化してきれをよくします。
オウビ軟稠エキス	30mg (原生薬換算量300mg)	桜皮(生薬)から抽出したエキスで，おだやかな作用により，たんを切れやすくします。

添加物として，パラオキシ安息香酸エチル，エタノール，精製白糖，D-ソルビトール液，カラメル，香料及びプロピレングリコールを含有する。

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して立てて保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)服用のつど，瓶の周りをよく拭いてからフタをしめてください。
- (5)計量カップはご使用のつど，水洗いなどして常に清潔に保管してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

## お問い合わせ先

本剤のご使用により，変わった症状があらわれるなど，何かお気づきの点がございましたら，お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室  
TEL 03-3661-2080 (ダイヤルイン)  
月～金曜日 9:00～17:00 (祝祭日を除く)

発売元  
**ゼリア新薬工業株式会社**  
東京都中央区日本橋小舟町10-11

製造販売元  
**日新薬品工業株式会社**  
滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1

