

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮咳去痰薬

コフハイドリン錠

第②類医薬品

- ・「ジヒドロコデインリン酸塩」が咳中枢に働き、咳を鎮めます。
- ・「dl-メチルエフェドリン塩酸塩」が気管支を広げ、咳を鎮めます。
- ・「グアイフェネシン」が痰の切れをよくします。
- ・「クロルフェニラミンマレイン酸塩」が不快な症状を緩和します。
- ・咳止め・去痰効果のある「キキョウ」、「麦門冬」といった2種類の生薬を配合しています。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい
本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬。
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい
(眠気があらわれることがあります。)
4. 過量服用・長期連用しないで下さい
(倦怠感や虚脱感等があらわれることがあります。)

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。
(4) 高齢者。
(5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(7) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
(8) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

- (2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい
便秘、口のかわき

(裏面もお読みください。)

効能・効果

せき、たん

用法・用量

次の1回量を1日4回食後及び就寝前に服用して下さい。

年齢	15才以上	11才以上15才未満	5才以上11才未満	5才未満
1回量	3錠	2錠	1錠	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法、用量を厳守して下さい。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (3)幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないようよく注意して下さい。

成分・分量

成分	1日量(12錠)中	働 き
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	咳中枢に作用し、咳を鎮めます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支を広げ、咳を鎮めます。
グアイフェネシン	300mg	痰の切れをよくします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	アレルギー性の咳を緩和します。
無水カフェイン	150mg	眠気を防止します。
キョウ乾燥エキス末(原生薬換算量600mg)	120mg	咳や痰の症状を緩和する生薬です。
麦門冬乾燥エキス(原生薬換算量1.5g)	300mg	咳症状を緩和する生薬です。

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、カルメロースCa、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mgを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

消費者相談窓口 日新製薬株式会社
TEL (0748)-62-4161
FAX (0748)-62-3417
受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

発売元

日新製薬株式会社

〒528-0013 滋賀県甲賀市水口町宮の前2-62

製造販売元

大昭製薬株式会社

〒520-3433 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

電話 0120-149-931