

第2類医薬品

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
必要なときに読めるように、大切に保管してください。

ヒットミンせき止めカプセル(せき止め薬)

「せき」は、異物や分泌物を体外へ排出して、身体を守ろうとする生体にとって有益な反射運動です。しかし、せきがはげしくなると体力の消耗を招いたり、安静や睡眠が妨げられたりして、病気の回復を遅らせることになります。

ヒットミンせき止めカプセルは、鎮咳剤（せき止め成分）と去たん剤（たんを出しやすくする成分）を配合したせき止め薬です。

特長

- せきの中樞と気管支の両方に作用
- たんを出しやすくするキキョウを配合
- 中枢性鎮咳剤のジヒドロコデインリン酸塩を配合
- たんを溶解するリゾチーム塩酸塩を配合



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください
本剤または本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など）
3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください（眠気などがあられることがあります。）
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけてください
5. 過量服用・長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人。 心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮ふの広範囲の発疹・発赤などが持続したり、急激に悪化する。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮ふや粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくとする、血尿などがあらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛みなどがあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強がみられた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

効能・効果
せき、たん

用法・用量
食後服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	2カプセル	3回
8才以上15才未満	1カプセル	
8才未満	服用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- カプセルの取り出し方
右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりしますと食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



成分・分量 1日量(6カプセル)中

成 分	分 量	は た ら き
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	せきの中枢に働いて、せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支をひろげて、せきをしずめ呼吸を楽にします。
リゾチーム塩酸塩	60mg(力価)	たんを溶解して出しやすくします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	抗ヒスタミン作用により、アレルギー性のせきをしずめます。
無水カフェイン	150mg	せき・たんをおさえる働きを助けます。
キキョウ乾燥エキス	120mg (原生薬換算量 1,200mg)	せきの原因となるたんを出しやすくする生薬です。

添加物：アルファー化デンプン、乳糖、硬化油、ゼラチン、酸化チタン、ラウリル硫酸Na

保管および取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 期限を過ぎた製品は服用しないでください。

〈お問い合わせ先〉

本品に関してのお問い合わせは、
お買い求め先または下記までご連絡ください。
常盤薬品工業株式会社
お客さま相談室 ☎0120-875-710まで
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎0120-149-931

製造販売元
常盤薬品工業株式会社
大阪市中央区安土町3-5-12