

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

せき・たん 第②類医薬品

新 コデロン錠F

鎮咳去痰薬



使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起りやすくなります)

- 次の人は服用しないこと。
12歳未満の小児。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮痛薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気があらわれることがあります。)
- 授乳中の人は本剤を使用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること。
- 過量服用・長期連用しないでください。
(倦怠感や虚脱感があらわれることがあります。)



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、ぜんぜん、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
- 服用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
循環器	動悸
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる。 疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする。血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

呼吸抑制 | 息切れ、息苦しさ等があらわれる。

- 服用後次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、口のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

せき、たん

用法・用量

1日3回、食間及び就寝時、水または白湯にて服用してください。

大人(15才以上) 1回……………4錠
12才以上～15才未満 1回……………2錠

(用法・用量に関連する注意)

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 12才未満の小児は服用しないでください。
- 小児に服用させるときには、保護者の指導のもとに服用させてください。

成分・分量(12錠中)

ジヒドロコデインリン酸塩 ……30mg-鎮咳作用
dl-メチルエフェドリン塩酸塩 ……55mg-鎮咳作用
クロロフェニラミンマレイン酸塩…12mg-抗ヒスタミン作用
ジプロフィリン ……80mg-気管支拡張作用
グアヤコールスルホン酸カリウム ……270mg-去たん作用

添加物：メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、リン酸水素カルシウム水和物、グリセロリン酸カルシウム、乳糖水和物、パレイショデンプン、結晶セルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

お問い合わせ先

本剤について何かお気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

お客様相談室

TEL : (076) 435-0139 (代)
受付時間: 午前 9:00 から午後 4:00
(土、日、祝日を除きます。)

製造販売元 **富山薬品株式会社**
富山市四方西岩瀬石瀬175