

服用に際し、この説明書を必ず読むこと。また、必要なとき読めるように大切に保管すること。

鎮咳去痰薬

せき、たんに

第2類医薬品

# 新ルビカップ<sup>®</sup>

## 製品の特徴

新ルビカップは、たんを溶かして出しやすくするリゾチーム塩酸塩に、せきを鎮めるジヒドロコディンリン酸塩、のどや気管支の炎症を抑えるクロルフェニラミンマレイン酸塩を配合した顆粒タイプの鎮咳去痰薬です。



## 使用上の注意

### ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

1. 次の人は服用しないこと。  
本剤または鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと。  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乘物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬。
3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないこと（眠気があらわれることがある）。

### ℞ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること。

- 1) 医師の治療を受けている人。
- 2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- 3) 授乳中の人は。
- 4) 本人または家族がアレルギー体质の人。
- 5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 6) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難。
- 7) 次の診断を受けた人。  
緑内障。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書をもって医師または薬剤師に相談すること。

- 1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	恶心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさなどとともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさなどがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれなどの激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。

- 2) 5~6回服用しても症状がよくならない場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること。  
便秘、口のかわき。

### 成分分量

3包（成人1日量）中

(1包 1.5g)

成 分	分 量	は た ら き
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せき中枢の興奮を抑制して、せきを鎮めます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	のどや気管支の炎症を抑え、せき・たんをやわらげます。
リゾチーム塩酸塩	60mg (力値)	消炎酵素剤で、のどのはれを緩和し、たんを溶かして出しやすくなります。

添加物として乳糖水和物、トウモロコシデンプン、パレイショデンプン、黄色5号、香料、白糖、CMC-Ca、ステアリン酸Mgを含有する。

### 用法用量

次の1回量を1日3回 食後に服用する。

年 令	1回量
成人 (15才以上)	1包
11才以上 15才未満	2/3包
8才以上 11才未満	1/2包
5才以上 8才未満	1/3包
3才以上 5才未満	1/4包
3才未満	服用しないこと

〈用法用量に関する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

### 効能効果

せき、たん。

### 保管および取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手のとどかない所に保管すること。
- 他の容器に入れかえないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
- 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、  
2日以内に服用すること。
- 表示の使用期限を過ぎたものは服用しないこと。

### 〔問い合わせ先〕

- 購入した薬局・薬店
- 日本製薬株式会社 お客様相談窓口 電話：03-3837-0987  
受付時間：午前10時～12時、午後1時～5時  
(土・日・祝日を除く)

製造販売元  
**日本製薬株式会社**  
東京都台東区上野3-23-9

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html> ☎ 0120-149-931