

この添付文書は、使用前によくお読みください。
また、使用が終わるまで大切に保管してください。

第②類医薬品

キキョウ流エキス配合

鎮咳去痰薬

コフジスW液

「せき」はのどや気管支の炎症などによって起こります。「せき」が頻発したり、長く続くとのどを痛めたり声がかれたりするだけでなく、睡眠をさまたげ、体力を消耗させ、ひいては病気に対する抵抗力を低下させ、好ましくない症状を引き起こす原因になります。

コフジスW液は「せき」の中核に作用する成分、気管支を拡張させて「せき」をしのめる成分、「たん」をうすめてはき出しやすくする成分などを配合していますので「せき」や「たん」にすぐれた効果を期待できます。

⚠ 使用上の注意**してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乘物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気等があらわれることがあります。)

4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください**5. 過量服用・長期連用しないでください****相談すること****1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

- | | |
|---|---|
| (1) 医師の治療を受けている人。 | (4) 高齢者。 |
| (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 | (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 |
| (3) 乳児
(乳児において、本剤に含まれるリゾチーム塩酸塩
を初めて服用した時に、ショック(アナフィラキシー)
があらわれたとの報告があります。) | (6) 次の症状のある人。

高熱、排尿困難
心臓病、高血圧、糖尿病、線内障、甲状腺機能障害 |

**2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談してください**

関係部位	症状
皮膚(ふ)	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイプルス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さまけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

便秘、口のかわき、眠気

4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

せき、たん

【用法・用量】

次の1回量を添付の目盛り付きコップで量り、1日3回毎食後及び必要に応じて、就寝前に服用してください。
また、1日6回まで服用しても支障ありませんが、その場合には約4時間の間隔をおいて服用してください。

年齢	1回量
15歳以上	5 mL
11歳以上 15歳未満	3.3 mL
8歳以上 11歳未満	2.5 mL
5歳以上 8歳未満	1.65 mL
3歳以上 5歳未満	1.25 mL
1歳以上 3歳未満	1 mL
1歳未満	服用しないでください

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法及び用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量と作用】

1日量(30mL)中

成 分	分量	作 用
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せき中枢に作用してせきをしづめ、呼吸を楽にします。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支をひろげて緊張をやわらげ、せきをしづめます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	抗ヒスタミン剤で、アレルギーが原因となって起こるせきをしづめます。
リゾチーム塩酸塩	60mg (力価)	粘稠なたんを分解し、はき出しやすくします。
カフェイン水和物	62mg	抗ヒスタミン剤による眠気を防止します。
キキョウ流エキス (原生葉換算量:0.5g)	0.5mL	ねばりついでいるたんをうすめて、はき出しやすくします。

添加物として、D-ソルビトール液、クエン酸水和物、サッカリンナトリウム水和物、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、エタノール、赤色2号、香料、エチルバニリン、バニリン、その他1成分を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがありますが、効果に変わりはありません。よく振って服用してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)誤用をさけ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。
- (5)服用のつど、瓶の口をよく拭き、フタをしっかりとしめておいてください。
- (6)いったん開栓した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- (7)添付の目盛り付きコップはご使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記まで
ご連絡頂きますようお願い申し上げます。

福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

TEL:0748-52-2323

受付時間:9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元

福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824