

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。



せき・たん
塩酸プロムヘキシシ配合

パブロンS せき止め液 第2類医薬品
〈せき止め薬〉

- ◆パブロンSせき止め液は、せきの原因となるたんを出しやすくする塩酸プロムヘキシシと塩化リゾチームを配合したせき止め薬です。
- ◆5つの成分が協力し合って、せき、たんの症状をやわらげます。



使用上の注意



してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 1 過量服用・長期連用しないでください
- 2 次の人は服用しないでください
本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 3 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬
- 4 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気があらわれることがあります)



相談すること



- 1 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)授乳中の人。
(4)乳児。(乳児において、本剤に含まれる塩化リゾチームを初めて服用した時に、ショック(アナフィラキシー)があらわれたとの報告があります)
(5)高齢者。
(6)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(7)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(8)次の症状のある人。
高熱、排尿困難
(9)次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。

- 2 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1)服用後、次の症状があらわれた場合。
- 3 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
便秘、口のかわき

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

効能、用法・用量、成分、保管及び取扱い上の注意については、裏面をよくご覧ください。 [9]

効 能

せき、たん



成 分

30mL中

成 分	分量	はたらき
塩酸プロムヘキシン	12mg	せきの原因となるたんを出しやすくします。
塩化リノチーム	60mg (カド)	のどにからんだたんをやわらかくして、出しやすくします。
リン酸ジヒドロコデイン	30mg	せき中枢にはたらき、せきをしずめます。
d,l-塩酸メチルエフェドリン	75mg	気管支を広げ、呼吸を楽にして、せきをしずめます。
マレイン酸カルビノキサミン	12mg	抗ヒスタミン作用により、せきをしずめます。

添加物：D-ソルビトール、クエン酸Na、安息香酸、パラベン、香料

用法・用量

1日3回毎食後、及び必要な場合には就寝前に服用してください。また場合により、4時間毎に1日6回まで服用することができます。

年齢	1回量	服用回数
15才以上	5mL	1日3回
11~14才	3mL	
8~10才	2.5mL	
5~7才	1.5mL	
1~4才	1mL	
1才未満	服用しないこと	

【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)キャップを閉める前にびんの口についた液を清潔なガーゼ等でふいてください。(液が固まってキャップが開けにくくなる場合があります)

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は6か月以内に服用してください。(品質保持のため)



せき、たんを早く治すため、次の点にもご注意ください

喫煙はさけましょう。



室内の空気の乾燥やホコリ等に気をつけましょう。



冷たい空気に当たらないようにしましょう。



栄養・睡眠を十分にとり、体力の消耗を防ぎましょう。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いいたします。



連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00 (土、日、祝日を除く)

発売元

大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>

製造販売元

明治薬品株式会社
富山県富山市三郷6番地