

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

※第2類医薬品

せき・たんに
鎮咳去痰薬

バコデ せき止め液

せきは、のどや気管支の病気にともなってあらわれる症状のひとつで、季節の変わり目、寒い冬、冷え込む夜間などによくおこります。

せきが長く続くとのどを痛めたり、肺や心臓に負担がかかり、睡眠がさまたげられ、体力は消耗し、病気に対する抵抗力も弱まってくる。

ノバコデせき止め液は「せき」をやわらげ、のどにからだ「たん」を出しやすくするようにした、のみやすいせき止め液です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 過量服用・長期連用しないでください
(倦怠感や虚脱感があらわれることがあります。)
2. 次の人は服用しないでください
本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人
3. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬
4. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気があらわれることがあります。)

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 授乳中の人
(4) 高齢者
(5) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(7) 次の症状のある人
高熱、排尿困難
(8) 次の診断を受けた人
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精 神 神 経 系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

裏面もお読み下さい。📄

皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
---	---

(2) 5~6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
便秘、口のかわき

■ 適 応 症

せき、たん

■ 用法・用量

1日3回毎食後及び必要な場合には就寝前に服用してください。また、場合によっては、約4時間の間隔を置いて1日6回まで服用することができます。

年 齢	15才以上	11~14才	8~10才	5~7才	5才未満
1回量	5mL	3mL	2mL	1mL	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は生薬成分を含むため、まれに沈でんを生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。
- (3) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (4) 計量カップは使用のつどよく水洗いして、本剤とともに清潔に保管してください。

■ 成 分

成 分	30mL中	作 用
※ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せきの中核に働いて、発作をやわらげ、せきをしずめます。
※リゾチーム塩酸塩	60mg(力価)	からまるたんを切り、出しやすくします。
※dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。
※クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	アレルギー性のせきをしずめます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	270mg	気道粘膜の分泌機能をたかめたんをうすめて排出をうながします。
無水カフェイン	60mg	大脳皮質に作用して、眠気を防ぎます。
バクモンドウ流エキス	2mL(バクモンドウとして2g)	せき・たんに効果があり、せきによる疲れをやわらげます。

添加物としてクエン酸、カラメル、安息香酸Na、還元麦芽糖水アメ、D-ソルビトール、ハチミツ、白糖、パラベン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、アルコール、香料を含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 服用のつど、びんの口をよく拭いてから、キャップをしめてください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

■ お問い合わせ先

森田薬品工業株式会社 お客様相談室
※ 電 話: (084) 943-8171
※ 受付時間: 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)



製造販売元

森田薬品工業株式会社

広島県福山市大門町野々浜1059番地

本社 東京都中央区日本橋2丁目1番3号

副作用被害救済制度
☎0120-149-931