

服用に際して、この文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮咳去痰剤

## リコデ®せき止め液Z

指定第2類医薬品

### 使用上の注意

#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
2. 服用後、乗物等の運転をしないで下さい。（眠気があらわれることがあります。）
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。
4. 過量服用・長期連用をしないで下さい

#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (5) 次の症状のある人。高熱、排尿困難
  - (6) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、てんかん
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
循環器	動悸
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合には直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の発熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止しこの外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

### 効能又は効果

せき、たん

## 用法及び用量

下記の量を1日3回毎食後に服用する。なお、場合により1日6回まで服用しても差し支えないが、この場合は服用間隔を4時間以上おくこと。（計量容器を添付する。）

年齢	1回量
成人（15歳以上）	10 mL
11歳以上15歳未満	6.5 mL
8歳以上 11歳未満	5.0 mL
5歳以上 8歳未満	3.0 mL
3歳以上 5歳未満	2.5 mL
1歳以上 3歳未満	2.0 mL

（用法・用量に関連する注意）

- （1）用法・用量を厳守して下さい。
- （2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- （3）2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させて下さい。
- （4）1歳未満の乳児には服用させないで下さい。
- （5）本剤は生薬成分を配合した内服液ですので、まれに沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用して下さい。

## 成分及び分量

60 mL（成人1日量）中に次の成分を含んでいます。

成分	分量
ジヒドロコデインリン酸塩	30 mg
d,l-メチルエフェドリン塩酸塩	45 mg
ジプロフィリン	120 mg
グアヤコールスルホン酸カリウム	270 mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12 mg
キキョウ流エキス	0.6 mL

添加物として白糖、D-ソルビトール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エタノール、安息香酸Na、パラベン、1-メントール、香料、グリセリン、プロピレングリコール

## 保管及び取扱い上の注意

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- （2）小児の手の届かない所に保管して下さい。
- （3）他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- （4）使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

## お問い合わせ先

発売元：ゼネル薬品工業株式会社

電話番号：06-6352-2381

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

発売元：ゼネル薬品工業株式会社 大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元：ゼネル薬工粉河株式会社 和歌山県紀の川市粉河840番地