

ZENEL

8歳から
服用できる

せき・ たん

L-カルボシステイン配合

リコネ[®]Sクリア

税 控除 対象

効能又は効果
せき、たん

保管及び取り扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

ノンシュガー

水なしでも
飲める



8包入り

第2類医薬品



4 962721 201738

副作用救済制度 電話0120-149-931

成分及び分量 (3包中) チペピジンヒベンズ酸塩75mg、L-カルボシステイン750mg
添加物：エリスリトール、バレイシヨテンブン、アスナリテーム(L-フェニルアラニン化合物)、
ヒドロキシプロピルセルロース、香料

用法及び用量 大人(15歳以上)1回1包、11歳以上15歳未満1回 $\frac{2}{3}$ 包、8歳以上11歳未満1回 $\frac{1}{2}$ 包
1日3回服用する。なお、服用間隔は4時間以上おくこと。

* (1)用法・用量を厳守すること。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもと
に服用させること。(3)8歳未満の小児は服用しないこと。



発売元

ゼネル薬品工業株式会社

大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元

ゼネル薬工粉河株式会社

和歌山県紀の川市粉河840番地

お問い合わせ先

電話番号：06-6352-2381

受付時間：9時から17時まで

(土、日、祝日を除く)

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい。(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 次の症状のある人。高熱(5) 次の診断を受けた人。肝臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

口
薬
器
→

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合には直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 5~6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

製造番号

使用期限

