

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 高熱のある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
【皮膚】発疹・発赤、かゆみ 【消化器】吐き気・嘔吐、食欲不振
【精神神経系】めまい
3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

● 効能・効果：せき

- 用法・用量：成人（15歳以上）は、1日量10gを水約600mLで煮て、約400mLに煮詰め、かすをこして取り去り、食前または食間に、3回に分けて服用してください。
15歳未満は服用しないでください。

● 保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用防止、品質保持のため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。

製造販売元

チベン製薬株式会社

〒567-0073 大阪府茨木市西穂積町3番8号
電話 072-622-2509 FAX 072-625-6320