



日本薬局方 カンゾウ

## 赤本®印 カンゾウ

◆甘草は、味が甘く煎じてのみやすい生薬です。

## ⚠ 使用上の注意

## ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと。  
グリチルリチン酸等を含有する内服薬(肝疾患用剤、抗ヒスタミン剤、胃腸薬、鎮咳去痰薬)
2. 長期連用しないこと。



## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
  - (1) 血圧の高い人又は高齢者
  - (2) 心臓又は腎臓に障害のある人
  - (3) むくみのある人
  - (4) 医師の治療を受けている人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文章をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
  - (1) まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

3. 5～6日間位服用しても症状の改善がみられない場合はこの文章を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能・効果、用法・用量、成分・分量、保管及び取扱い上の注意、  
お問い合わせ先については裏面をよくご覧ください。

## 〔効能・効果〕

激しい咳、咽喉痛の緩解

## 〔用法・用量〕

大人(15歳以上)は1日量5gを、水約600mlをもって約400mlに煮つめ、かすをこして取り去り、食前又は食間3回に分服する。

食間とは…

食後2～3時間を指します。

## 〈用法及び用量に関連する注意〉

定められた用法・用量を厳守してください。


15歳未満は服用しないで下さい。

## 〔成分・分量〕 本品1日量5g中

日本薬局方 カンゾウ 5g

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管して下さい。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないで下さい。
- (4) 本品は、天然物の性質上吸湿してカビが生えたり、虫がつくこともありますので、保管には充分ご注意下さい。
- (5) 煎液は腐敗を防ぐために冷所に保管して下さい。
- (6) 使用期限をすぎた製品は使用しないで下さい。



### 〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

株式会社 **築田三樹園社**

お客様相談係 電話(082)221-3603

受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日は除く)

### 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

株式会社 **築田三樹園社**

広島市中区東白島町21-21

登録商標

赤本

第2類医薬品

日本薬局方

品名

赤本印 カンゾウ

内容量

40g

Lot 0403351



4985464140072

\*ご注意 生薬には引湿性があり、保存法が悪いとカビが生えたり、虫がつくことがありますから、湿気のない風通しのよい場所に保存して下さい。

使用期限

2017.3



株式会社

ツクダサンジュエンシャ  
築田三樹園社

広島市中区東白島町21番21号

TEL(082)221-3603

FAX(082)223-8871

生薬製剤

第2類医薬品

# 赤本®印 カンゾウ

(日本薬局方カンゾウ)

## ⚠ 使用上の注意

**してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと。

グリチルリチン酸等を含有する内服薬(肝疾患用剤、抗ヒスタミン剤、胃腸薬、鎮咳去痰薬)

2. 長期連用しないこと。



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- (1) 血圧の高い人又は高齢者 (2) 心臓又は腎臓に障害のある人  
(3) むくみのある人 (4) 医師の治療を受けている人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文章をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

(1) まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

3. 5～6日間位服用しても症状の改善がみられない場合はこの文章を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【効能・効果】 激しい咳、咽喉痛の緩解

【用法・用量】 大人(15歳以上)は1日量5gを、水約600mlをもって約400mlに煮つめ、かすをこして取り去り、食前又は食間3回に分服する。

※15歳未満は服用しないこと。

【成分・分量】 本品1日量5g中 日本薬局方 カンゾウ 5g

【保管及び取扱い上の注意】 (1) 服用に際しては、添付文書をよく読むこと。

- (2) 直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。  
(3) 小児の手のとどかない所に保管すること。  
(4) 他の容器に入れかえないこと。  
(5) 使用期限をすぎた製品は使用しないこと。

### 〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

株式会社 **築田三樹園社**

お客様相談係 電話(082)221-3603  
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日は除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

株式会社 **築田三樹園社**  
広島市中区東白鳥町21-21