

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

## 鎮咳去痰薬

## 第②類医薬品

## 小児用せきどめシロップチルダンプラス

小児用せきどめシロップチルダンプラスは、せきどめ効果のあるナンテンジツ、キキョウ、セネガを配合した小児用のせきどめシロップです。

## 特 長

- ノンカフェインでお子さまの眠りをさまたげません。
- 7種類の成分が働いて、せき、たんを鎮めます。
- お子さまが簡単に開けられない、安全キャップを採用しています。
- 甘くて飲みやすい、いちごミルク味のシロップ剤です。

## ⚠ 使用上の注意

本剤は小児用ですが、鎮咳去痰薬として定められた一般的な注意事項を記載しております。

## してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい  
(眠気等があらわれることがあります。)
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい
4. 過量服用・長期連用しないで下さい

## 相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (5) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
  - (6) 次の診断を受けた人。  
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい  
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

## 効能・効果

せき、たん

## 用法・用量

1日3回毎食後及び必要な場合には就寝前に服用して下さい。場合により1日6回まで服用して差し支えありませんが、原則として4時間の間隔をおいて服用して下さい。

年齢	1回量	備考
8才以上11才未満	10.0mL	添付の計量コップを用い、年齢に応じて、左記の分量を計って下さい。
5才以上8才未満	6.5mL	
3才以上5才未満	5.0mL	
1才以上3才未満	4.0mL	
3ヵ月以上1才未満	2.0mL	
3ヵ月未満	服用しないこと	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法、用量を厳守して下さい。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (3)2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止む得ない場合にのみ服用させて下さい。

## 成分・分量

成分	1日量(60mL)中	働 き
ジヒドロコデインリン酸塩	15mg	せき、たんの緩和
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	37.5mg	せき、たんの緩和
グアイフェネシン	150mg	たんの緩和
クロルフェニラミンマレイン酸塩	6mg	鼻水、鼻づまりの緩和
ナテンジツ流エキス(ナテンジツとして700mg)	0.7mL	せきの緩和
キキョウ流エキス(キキョウとして210mg)	0.21mL	せき、たんの緩和
セネガ流エキス(セネガとして700mg)	0.7mL	たんの緩和

添加物としてD-ソルビトール、クエン酸、パラベン、安息香酸Na、エタノール、プロピレングリコール、香料、白糖、カラメルを含有する。

本剤に卵、牛乳由来の成分は配合されていません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)ビンの口、計量コップは常に清潔にして下さい。
- (5)使用期限はケース底面及びビンラベルに記載されています。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く服用して下さい。
- (7)本剤は生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用して下さい。

安全キャップの使用方法は、ケース側面及びビンラベルに記載してあります。キャップが開けにくい場合は、キャップ部分をお湯(50~60℃)に2~3分つけると開けやすくなります。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

消費者相談窓口

日新製薬株式会社

TEL 0120-967-862

FAX 0748-62-3417

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

製造販売元

# 日新製薬株式会社

〒528-0013 滋賀県甲賀市水口町宮の前2-62