

服用される前に必ずこの文書をお読み下さい。また、薬とともに大切に保存してください。



鎮咳薬
去痰薬

コーブパウダー

【この薬の特徴】本剤は長年の経験を基として創製された咳止め薬です。
西洋薬と生薬を配合した良薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。

- 次の人は服用しないこと。
12才未満の小児
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。（眠気等があらわれることがある。）
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること。
- 過量服用・長期連用しないこと。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 高齢者
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人：高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人：心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	皮膚	消化器	精神神経系	泌尿器
症状	発疹・発赤、かゆみ	吐き気・嘔吐、食欲不振	めまい	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合は、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
便秘、口のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状の改善がみられない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【効 能】 たん(痰)、せき(咳)

【用法・用量】 下記の量を1日3回、食後に水又はお湯と一緒に服用して下さい。
服用間隔は4時間以上おくこと。

年 齢	1 回 量
大人 (15歳以上)	1 包
12歳～14歳	2/3包

【用法についての注意】

小児(12歳～14歳)に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分と働き】 1日量 (3包 3.0g)中

成 分	分 量	成 分 の 働 き
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	咳の中枢に作用して、咳を鎮めます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支を拡張して、咳を鎮めます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	抗ヒスタミン作用により、くしゃみ、鼻水、鼻づまりの症状を抑えます。
キキョウ末	400mg	気道粘膜の分泌を高めて、たんを切りやすくします。
車前草乾燥エキス	110mg (車前草として1100mg)	気道粘膜の分泌を高めて、たんを出しやすくします。
石蒜エキス-A	30mg (セキサンとして240mg)	たんを出しやすくします。

*添加物として乳糖水和物、バレイショデンプンを含有する。

*生薬3剤・・・たんを出しやすくして咳を鎮める薬で古くから使われています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因となったり品質が変わることがある。)
- (4) 1包を分割して使用する場合は口を折り返して保管し開封後3日を過ぎたものは服用しないで下さい。
- (5) 生薬が配合されていますので湿気に注意して保管して下さい。

【お客様相談窓口】平坂製薬株式会社

☎ 0120-123-728(土、日、祝日を除く9時から17時まで)

製造販売元 **平坂製薬株式会社**

長崎県西彼杵郡時津町久留里郷 1439-52 〒851-2107

ホームページ <https://hirasaka.co.jp/>

副作用被害救済制度の問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎ 0120-149-931

