

[平成17年11月作成]服用に当たって、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

# 強力明治せきどめ

医薬品



使用上の注意



## してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。



## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6) 薬によりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。

心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

裏面もお読みください。

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

便秘、口のかわき

◇効能又は効果 せき、たん

◇用法および用量

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
15才以上	1包	3回
11才以上15才未満	$\frac{2}{3}$ 包	
8才以上11才未満	$\frac{1}{2}$ 包	
5才以上8才未満	$\frac{1}{3}$ 包	
3才以上5才未満	$\frac{1}{4}$ 包	
3才未満	服用させないこと	

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

◇成分及び分量 3包中

リン酸ジヒドロコデイン.....20mg  
ノスカピン.....48mg  
dl-塩酸メチルエフェドリン.....60mg  
マレイン酸クロルフェニラミン.....12mg  
グアヤコールスルホン酸カリウム.....270mg  
添加物として乳糖、バレイシヨデンブン、ケイ酸A $\ell$ 、サッカリンNa、香料、カルメロースNa、赤色3号を含有する。

◇保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割した残りをを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 期限をすぎた製品は服用しないでください。

お客様相談窓口

TEL 076-476-1111

9:00～16:30

(土、日、祝祭日は除きます。)



製造販売元

明治製薬株式会社

富山県滑川市中川原77