

服用前にこの添付文書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

鎮咳去痰薬

せき・たん・ぜんそくに

第2類医薬品

スパーク[®]せきどめ顆粒

スパークせきどめ顆粒は、気管支拡張作用のあるトリメトキノール塩酸塩水和物、痰をきりやすくするグアヤコールスルホン酸カリウム、消炎作用のあるリゾチーム塩酸塩、オウゴン乾燥エキス等を配合した服用しやすい鎮咳去痰薬で、せき、たん、ぜんそくに効果があります。



使用上の注意

❌【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい

本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい

(眠気があらわれることがあります)



【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい

(1)医師の治療を受けている人

(2)妊婦又は妊娠していると思われる人

(3)高齢者

(4)本人又は家族がアレルギー体質の人

(5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

(6)次の症状のある人：高熱、排尿困難

(7)次の診断を受けた人：心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。

(2)5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい

口のかかわき

【効能効果】

せき・たん・ぜんそく

【用法用量】

次の量を毎食後及び就寝前に服用して下さい。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人(15才以上)	1 包	4回
11才以上15才未満	2/3包	
8才以上11才未満	1/2包	
5才以上 8才未満	1/3包	
3才以上 5才未満	1/4包	
3才未満	服用しないこと	

(1)用法用量を厳守して下さい。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

【成分分量】

4包(成人1日量)中

成 分	分 量	作 用
トリメトキノール塩酸塩水和物	6mg	気管支を拡張する働きがあります。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	抗ヒスタミン作用があり、喉の炎症を抑えます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	270mg	痰を薄め、取り除きやすくします。
リゾチーム塩酸塩	60mg(力価)	痰を溶解し、はき出しやすくします。
オウゴン乾燥エキス	100mg	コガネバナの根から抽出したエキスで、消炎効果があります。

添加物としてD-マンニトール、乳糖、サッカリンNa、L-メントール、アラビアゴム、香料、ペパーミント油を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。

(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。

(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。

(5)配置期限の過ぎた商品は服用しないで下さい。

■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室

電 話：(0748) 88-3180(大代表)

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元



滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町滝879