

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鎮咳去痰薬

第2類医薬品

ニッシンせき止め顆粒

■特徴 ニッシンせき止め顆粒は、サッと溶けるさわやか顆粒。携帯に便利なスティック包装ですので、どこでも飲める、鎮咳去痰薬です。シュガーレス顆粒剤で、3才以上のお子様からご年配の方まで、安心してご使用になれます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。
本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気等があらわれることがあります)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(4) 次の症状のある人
高熱、排尿困難
(5) 次の診断を受けた人
緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
アナフィラキシー様症状	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。

(裏面もお読みください)

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■効能・効果 せき、たん

■用法・用量 次の量を食後に服用してください。

年 令	1 回量	1 日服用回数
15才以上(大人)	1包	3 回
11才以上15才未満	2/3包	
8才以上11才未満	1/2包	
5才以上8才未満	1/3包	
3才以上5才未満	1/4包	
3才未満	服用しないでください	

「用法・用量に関連する注意」

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■成分・分量 (1.2g×3包中：大人1日量)

成 分	分 量	はたらき
チベピジンヒベンズ酸塩	75mg	せき中枢の興奮をはずめてせきを止めます。
リゾチーム塩酸塩	60mg (力価)	のどにからまるたんを溶解して、出しやすくします。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	6mg	抗ヒスタミン剤で、アレルギーが原因となって起こるせきに効果があります。

添加物として、キシリトール、ヒドロキシプロピルセルロース、l-メントールを含みます。

■保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)

(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

株式会社パナケイア製薬「お客様相談係」電話(0766)36-1118
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用救済制度
電話：0120-149-931