

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。



せき・たんに
ブロムヘキシン塩酸塩配合

こどもパブロンせき止め液

第2類医薬品
(せき止め薬)

- ◆こどもパブロンせき止め液は、たんを出しやすくするブロムヘキシン塩酸塩を配合したお子さま専用のせき止め薬です。
- ◆ストロベリー風味の飲みやすいシロップ剤です。



使用上の注意

本剤は小児用ですが、せき止め薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- ① 次の人は服用しないでください
本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ② 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- ③ 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります)
- ④ 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
- ⑤ 過量服用・長期連用しないでください



相談すること



- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 乳児。(乳児において、本剤に含まれるリゾチーム塩酸塩を初めて服用した時に、ショック(アナフィラキシー)があらわれたとの報告があります)
(4) 高齢者。
(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
(7) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、
甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症*

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
呼吸抑制*	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

- ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

- ③ 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、口のかわき、眠気
- ④ 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能

せき、たん



成分

54mL中

成分	分量	はたらき
ブロムヘキシン塩酸塩	7.2mg	せきの原因となるたんを出しやすくします。
リゾチーム塩酸塩	36mg(力価)	のどにからんだたんをやわらかくして、出しやすくします。
ジヒドロコデインリン酸塩	18mg	せき中枢にはたらき、せきをしずめます。
dI-メチルエフェドリン塩酸塩	45mg	気管支を広げ、呼吸を楽にして、せきをしずめます。
マレイン酸カルピノキサミン	7.2mg	抗ヒスタミン作用により、せきをしずめます。

添加物：D-ソルビトール、パラベン、安息香酸、クエン酸Na水和物、香料、グリセリン、バニリン

用法・用量

1日3回、毎食後及び必要な場合には、就寝前に服用してください。
また場合によっては、1日6回服用できますが、その場合は、原則として約4時間の間隔をおいて服用してください。

年齢	11才～14才	8才～10才	5才～7才	1才～4才	1才未満
1回量	9mL	7.5mL	4.5mL	3mL	服用しないこと
服用回数	1日3回				


[注意]

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 12才未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先してください。*
- キャップを閉める前にびんの口についた液を清潔なガーゼ等でふいてください。(液が固まってキャップが開けにくくなることがあります)

安全キャップの使用方法

●開け方

- ①キャップを下に強く押しながら
- ②矢印の方向に回して開けてください。



●閉め方

- びんの口の周囲をよくふいてから、普通のキャップを閉める要領でしっかり閉めてください。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は6ヵ月以内に服用してください。(品質保持のため)



お子さまのせきやたんを治すために、次の点にもご注意ください



安静にし、睡眠を十分にとりましょう。



室内の空気の乾燥やホコリなども気をつけましょう。



栄養を十分にとり、体力の消耗を防ぎましょう。

この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。



連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室
電話 03-3985-1800
受付時間 8:30～21:00(土、日、祝日を除く)

発売元

大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>

製造販売元

明治薬品株式会社
富山県富山市三郷6番地

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)