

第3類医薬品 南天のど飴クール(せき止め薬)

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。
必要なときに読めるように、大切に保管してください。

使用上の注意

[してはいけないこと] (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります) 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください/他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など)

[相談すること] 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (4) 次の症状のある人。 高热 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください 3. 5~6回

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

効能・効果 せき、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

用法・用量 食間に服用してください。下表の1回量を1錠ずつ口中に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。なお、

年齢	1回量	1日服用回数	1回分を服用後は、2時間以上の間隔をおいて服用してください。
成人(15才以上)	3錠	3回	
8才以上15才未満	2錠		
5才以上8才未満	1錠		
5才未満	服用しないでください。		

<用法・用量に関連する注意> (1) 用法・用量を厳守してください。 (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量 1日量(9錠)中 南天実乾燥エキス…500mg 添加物：黒砂糖、白糖、水アメ、メントール、アラビアゴム、カラメル、サラシミツロウ、タルク、カルナウバロウ、赤色3号、青色1号、黄色5号、香料

保管および取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。 (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。 (3) 品質を保持するため、開封後は袋の口を折り曲げて、保管してください。 (4) 期限を過ぎた製品は服用しないでください。

1錠あたり7kcal

067322
TISJ203

製造販売元

常盤薬品工業株式会社

大阪市中央区安土町3-5-12

NOEVIR GROUP

お問い合わせは

常盤薬品工業株式会社

お客さま相談室 ☎0120-875-710まで

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

南天のど飴のブランドサイトはこちら

<http://nodoame.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

☎0120-149-931