

販売名: のどぬーるトローチ

せき、たん、のどの痛みに
のどぬーるトローチ

のどの痛みに効く



鎮咳去痰薬

第2類医薬品

特徴

- 1 セチルピリジニウム塩化物水和物の働きで、炎症が悪化しないように口やのどを殺菌・消毒します。
- 2 フェノールフタリン酸デキストロメトルファンがせきを鎮め、のどの炎症による「痛み」や「はれ」などのなおりを早めます。
- 3 グアヤコールスルホン酸カリウムがたんのきれをよくして気道をなめらかにします。
- 4 ペパーミント味なので口の中もさわやかです。

▲使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- ① 次の人は使用しないこと
 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
- ② 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬
- ③ 使用後、乗物または機械類の運転操作をしないこと
 (眠気があらわれることがある)

🗨️ 相談すること

- ① 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること
 (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦または妊娠していると思われる人 (3) 授乳中の人 (4) 本人または家族がアレルギー体質の人 (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (6) 次の症状のある人: 高熱
- ② 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります
 その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさなどとともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさなどがあらわれる

(2)5~6回使用しても症状がよくならない場合

成分・分量 1日量(6錠(1錠:1400mg))中


成 分	分量
セチルピリジニウム塩化物水和物	6.0mg
フェノールフタリン酸デキストロメトルファン	60.0mg
グアヤコールスルホン酸カリウム	180.0mg

添加物として、精製白糖、還元麦芽糖水アメ、合成ケイ酸アルミニウム、ヒプロメロース、ポビドン・トメントール、ユーカリ油、d-カンフル、ステアリン酸カルシウム、シヨ糖脂肪酸エステル、香料、青色1号を含有する

効能・効果

せき、たん、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

こんなときに



用法・用量

- 11才以上: 1回1錠、1日6回、使用間隔は2時間以上おくこと
- 5才以上11才未満: 1回1錠、1日3回、使用間隔は4時間以上おくこと
- 口中に含み、かまずにゆっくり溶かすこと

●用法・用量に関連する注意事項

- (1) 定められた用法・用量を守ること
- (2) 本剤は、5才未満の小児には使用させないこと
- (3) 5才以上の小児に使用させる場合には、保護者の監督指導のもとに使用させること

トローチの取り出し方

下図のようにトローチのはいつているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して使用すること(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながる)



おしだす

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管すること
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと
 (誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

発売元 **小林製薬株式会社** 製造販売元 **前田薬品工業株式会社**
 〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10 〒930-0916 富山県富山市向新庄町
 製品のお問い合わせ先 1-18-47
 お客様相談室 ☎06(6203)3625
 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
 ホームページアドレス <http://ppi.kobayashi.co.jp>