

この添付文書は、使用前によくお読みください。  
 なお、使用が終わるまで大切に保管してください。

第3類医薬品

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

# ポビドンGうがい薬

ポビドンGうがい薬は、さまざまな細菌・真菌・ウイルスなどの微生物に対して殺菌作用をもった「ポビドンヨード」を有効成分とする製剤で、のどの殺菌・消毒・洗浄ならびに口臭を除去することができるうがい薬です。

## [特徴]

- ・ポビドンGうがい薬は、口腔内のさまざまな細菌に対し強い殺菌作用があります。
- ・ポビドンGうがい薬によるうがいは、口腔内の細菌も洗浄し、細菌に侵された患部を消毒します。
- ・ポビドンGうがい薬は、口臭や口内の不快感をとり去ります。
- ・ポビドンGうがい薬は、口内の粘膜を刺激せず、使用後はさわやかです。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
 次の人は使用しないでください  
 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2) 次の症状のある人。  
口内のひどいただれ。
  - (3) 次の診断を受けた人。  
甲状腺機能障害
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚(ふ)	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消 化 器	吐き気
そ の 他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

## 【用法・用量】

1回、本剤2～4mLを水約60mLにうすめて、1日数回うがいしてください。

### ＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。  
うがい液をはきだせない年齢の小児には使用させないでください。
- (3) うがい用にのみ使用し、内服しないでください。
- (4) 本剤は使用する時にのみ希釈し、うすめた液は、早めに使用してください。
- (5) 使用法

うがいの仕方

キャップをあけて容器をさかさに持ち、指でゆっくり押しして本剤2～4mL（添付の計量コップを斜めにして、2～4目盛）をとり、水でうすめて約60mL（計量カップを水平にもどし目盛60）にし、ていねいにうがいしてください。



## 【成分・分量】

1mL中 ポビドンヨード……………70mg

（有効ヨウ素7mg含有）

添加物として、ヨウ化K、*l*-メントール、サッカリンナトリウム水和物、グリセリン、アルコール、香料を含有します。

### ＜成分・分量に関連する注意＞

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料（義歯等）が変色することがあります。  
また、ごくまれに歯などの表面の状態により着色することがあります。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 薬液が衣類に付着した時は、すぐに水または洗剤で洗ってください。落ちにくい場合にはチオ硫酸ナトリウム（ハイポ）で洗ってください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。
- (6) 添付の目盛り付きコップはご使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬局又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

**福地製薬株式会社**

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

TEL：0748-52-2323

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元

**福地製薬株式会社**

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824